

Planter

Effekt af svampemidler i frøgræs - 2022

Nogle af de mest anvendte svampemidler er blevet forbudt, så nye løsninger skal anvendes i frøgræs

Analyse

12. november 2020
Opdateret 26. april 2022

I tabel 1 ses en oversigt over godkendte svampemidler i frøgræs og deres effekt vurderet ud fra forsøg ved Aarhus Universitet og landsforsøgene. Nogle midler er godkendt i "frøgræs", mens andre kun er godkendt i de nævnte frøgræsarter. For følgende midler er godkendelsen baseret på en mindre anvendelse: Balaya, Entargo og Pictor Active (Entargo + Comet Pro). Firmaet anbefaler tilsætning af 0,2 l/ha Agropol til Pictor Active.

Godkendelsen af Propulse forventes ifølge firmaet udvidet til også at omfatte frøgræs til sæson 2022. Propulse har moderat effekt mod rustsvampe og skal ligesom i korn blandes med et andet produkt mod rustsvampe.

Vær opmærksom på, at Balaya kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson og senest 31. maj. Orius Max 200 Ew må senest anvendes i vækststadiet 55, mens de øvrige midler i tabel 1 må anvendes til vækststadiet 69. For Entargo er der dog ingen sprøjtefrist. Vær opmærksom på, at der skal være mindst 21 dage mellem to behandlinger med Comet Pro. Af tabel 1 fremgår, at også andre midler har krav til minimum afstand mellem 2 behandlinger.

Nye triazolregler

De gældende triazolregler skal overholdes.

Af midlerne i tabel 1 er Orius Max 200 EW, Folicur Xpert og Balaya omfattet af triazolreglerne. Der er dog som bekendt kommet nye triazolregler, som skal overholdes, såfremt der bruges midler af de omfattede midler med nye navne og nye etiketter. Orius Max 200 EW skifter navn til Orius Gold. Folicur Xpert skifter navn til Folicur Xpert 240 EC, mens Balaya ikke skifter navn. Anvendes således **Orius Gold** og **Folicur Xpert 240 EC** er reglerne for brug væsentlig anderledes for disse midler end for Orius Max 200 EW og Folicur Xpert.

Se yderligere i middeldatabasen og i [Der er kommet nye triazolregler](#). Se de hidtidige regler i [Restriktioner i brugen af triazol svampemidler](#).

Tabel 1. Oversigt over godkendte svampemidler i frøgræs. 0-3 skala, hvor 0 = ingen effekt, 1 = svag effekt, 2 = middel effekt og 3 = god effekt.

Se tekst mht. nye triazolregler for Orius Gold, Folicur Xpert 240 EC og Balaya.



Middel	Virkemekanisme	Godkendt i	Normaldosis, l/ha	Maks. antal behandlinger og evt. krav til afstand mellem 2 behandlinger	Sortrust, brunrust, gulrust	Kronrust, engrapgræsrust	Bladplet (Drechslera, Mastigosporium) ¹⁾	Meldug
					Effekt 0-3 skala			
Amistar/ Mirador	Strobilurin	Frøgræs	0,5 ³⁾	maks. 0,5 pr. sæson	xx	x	xxx	x ²⁾
Balaya ⁴⁾	Triazol + strobilurin	Frøgræs	1,5	1	xx(x)	xx(x)	xxx	xx
Comet Pro	Strobilurin	Rajgræs, strandsvingel, engrapgræs, hundegræs, engsvingel, rødsvingel, bakkesvingel	1,25	2, 21 dage	xx	xx	xxx	x ²⁾
Entargo	SDHI	Frøgræs	0,7	1	-	-	x(x)	-
Folicur Xpert	Triazol (tebuconazol + prothioconazol)	Frøgræs	0,5 ³⁾	2, maks. 2 x 0,5 l	xxx	xxx	xxx	xx(x)
Orius Max 200 EW	Triazol (tebuconazol)	Frøgræs	0,6 ³⁾	ingen krav	xxx	xxx	xxx	xx(x)
Pictor Active	SDHI + strobilurin	Frøgræs	1,0	2, 21 dage	xx	xx	xxx	x ²⁾
Talius	(proquinazid)	Alm. rajgræs, rød- og strandsvingel	0,25	2, 14 dage, maks. 0,25 l/ha/sæson	-	-	-	xx(x)

1) Bladpletsvampe dækker over de mest udbredte arter, men for nogle bladpletsvampe kan effekterne være anderledes.

2) Ukendt om der er fuld effekt på meldug af strobiluriner.

3) Effekt vurderet ud fra 1,0 l for Folicur Xpert og Amistar/Mirador hhv. ud fra 1,25 l for Orius Max.

4) Må senest anvendes 31. maj og kun 1 gang pr. sæson.

Emneord

Bekæmpelse

Frøafgrøder

Fungicider

+1

Vil du vide mere?





Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 2028 2695

Støttet af

Frøafgiftsfonden

SEGES Innovation P/S Tlf. 8740 5000
Agro Food Park 15 Fax. 8740 5010
8200 Aarhus N Email info@seges.dk

