

## **Insektmidlet Lamdex (reg. nr. 396-77) har fået ændret den mindre anvendelse til brug i markfrø til frøproduktion.**

Ændringen betyder at aksløberens larve er tilføjet til listen over skadevoldere. Bekæmpelse af aksløberens larve i markfrø til frøproduktion med Lamdex, skal ske på et meget tidligt stadie og straks ved konstateret angreb. Der må ved konstateret angreb af aksløberens larve anvendes max 0,4 kg. pr. ha. og der må max udføres en behandling inden for samme vækstår.

Generel vejledning for mindre anvendelse af Lamdex i markfrø til frøproduktion.

- Må kun anvendes mod skadedyr i markfrø til frøproduktion
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Halmen og rester må ikke opfodres.
- Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Der må i alt kun anvendes 0,6 kg/ha Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstår.
- Der må behandles ved konstateret angreb

Læs [vejledningen til mindre anvendelse](#) omhyggeligt før brug.

[Læs mere om Lamdex i Middeldatabasen](#)

30. januar 2023