

Godkendelse af mindre anvendelse af [Matrignon 72 \(64-136\)](#) i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland.

De mindre anvendelser som tilhørte Matrignon 72 SG (64-74) er nu samlet under en fælles mindre anvendelse som er overført til Matrignon 72 (64-136) Godkendelsen dækker afgrøderne: korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland.

Brugsanvisning					
Afgrøde	Skadevolder	Max. dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)
Korsblomstret havefrø, olieræddike og gul sennep til frøavl	Kamille, Brandbæger og andet kurveblomstret ukrudt	Bredsæede afgrøder: 110 g/ha* Rækkesæede afgrøder: 140 g/ha* Båndsprøjtning i 12,5 cm bånd og 50 cm rækkeafstand	100-300 L/ha	1 gang hver 4. år	Bredsæede afgrøder: Afgrodens stadi 31-50 Rækkesæede afgrøder: Når ukrudtet har 2-4 blade udfoldet
Radise og beder til frøavl	Kamille, Brandbæger og andet kurveblomstret ukrudt	Bredsæede afgrøder: 110 g/ha Rækkesæede afgrøder: 140 g/ha Båndsprøjtning i 12,5 cm bånd og 50 cm rækkeafstand	100-300 L/ha	1 gang hver 4. år	Bredsæede afgrøder: Efter fremspiring når afgrøden har 6 blade Rækkesæede afgrøder: Når ukrudtet har 2-4 blade udfoldet Må ikke anvendes senere end maj
Timian og purløg til frøavl	kurveblomstret ukrudt, specielt tidsler	Rækkesæede afgrøder: 140 g/ha Båndsprøjtning i 12,5 cm bånd og 50 cm rækkeafstand	100-300 L/ha	1 gang hver 4. år	Rækkesæede afgrøder: Når ukrudtet har 2-4 blade udfoldet Må ikke anvendes senere end maj

Generel vejledning for mindre anvendelse af Matrignon 72 (64-136) i korsblomstret havefrø, olie-
ræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland:

- Må kun anvendes mod kurveblomstret ukrudt i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise beder, timian og purløg til frøavl på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadi 50
- For at beskytte grundvand: Max 1 behandling pr. areal hvert 4. år på samme areal
- Må i radise, beder, timian og purløg ikke anvendes senere end i maj måned
- Halm og rester må ikke opfodres
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

[Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.](#)

[Læs mere om Matrignon 72 i Middeldatabasen](#)

17. marts 2023