

Planter

Effekt af svampemidler i frøgræs - 2023

Se oversigt over godkendte midler og effekter.

Analyse

12. november 2020
Opdateret 12. april 2023

I tabel 1 ses en oversigt over godkendte svampemidler i frøgræs og deres effekt vurderet ud fra forsøg ved Aarhus Universitet og landsforsøgene. Nogle midler er godkendt i "frøgræs", mens andre kun er godkendt i de nævnte frøgræsarter. For følgende midler er godkendelsen baseret på en såkaldt "mindre anvendelse": Balaya, Entargo og Pictor Active (Entargo + Comet Pro). Firmaet anbefaler tilsætning af 0,2 l/ha Agropol til Pictor Active.

Bayer oplyser, at de først forventer Propulse godkendt i frøgræs til sæson 2024.

Vær opmærksom på de nye triazolregler. Se også [Der er kommet nye triazolregler](#). Af midlerne i tabel 1 er Balaya, Folicur Xpert EC 240 og Orius Gold omfattet af reglerne.

Vær opmærksom på, at Balaya kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson og senest 31. maj. Orius Gold må senest anvendes i vækststadiet 55, mens de øvrige midler i tabel 1 må anvendes til vækststadiet 69. For Entargo er der dog ingen sprøjtefrist. Vær opmærksom på, at der skal være mindst 21 dage mellem to behandlinger med Comet Pro. Af tabel 1 fremgår, at også andre midler har krav til minimum afstand mellem 2 behandlinger. Frøgræshalm behandlet med midlerne i tabel 1 må ikke opfodres.



Tabel 1. Oversigt over godkendte svampemidler i frøgræs og effekter. 0-3 skala, hvor – = ingen effekt, 1 = svag effekt, 2 = middel effekt og 3 = god effekt.

Middel	Virkemekanisme	Godkendt i	Normaldosis, l/ha	Maks. antal behandlinger og evt. krav til afstand mellem 2 beh.	Sortru brunru gulrus
Amistar/Mirador	Strobilurin	Frøgræs	0,5 ³⁾	Maks. 0,5 l/ha/sæson	xx
Balaya	Triazol+ strobilurin	Frøgræs	1,5 ⁴⁾	1, senest 31. maj	xx(x)
Comet Pro	Strobilurin	Rajgræs, strandsvingel, engrapgræs, hundegræs, engsvingel, rødsvingel, bakkesvingel	1,25	2, 21 dage	xx
Entargo	SDHI	Frøgræs	0,7	1	-
Folicur Xpert EC 240	Triazol	Frøgræs	0,5 ^{3) 4)}	2, 14 dage	xxx
Orius Gold	Triazol	Frøgræs	0,4-0,6 ^{3) 4)}	2	xxx

Middel	Virkemekanisme	Godkendt i	Normaldosis, l/ha	Maks. antal behandlinger og evt. krav til afstand mellem 2 beh.	Sortru brunru gulrus
Pictor Active (Entargo + Comet Pro)	SDHI+ strobilurin	Frøgræs	1,0 eller 2 x 0,5	2, 7 dage	xx
Talius	(proquinazid)	Alm. rajgræs, rød- og strandsvingel	0,25	2, 14 dage, maks. 0,25 l/ha/sæson	-



- 1) Bladpletsvampe dækker over de mest udbredte arter, men for nogle bladpletsvampe kan effekterne være anderledes.
- 2) Ukendt om der er fuld effekt på meldug af strobiluriner.
- 3) Effekt vurderet ud fra 1,0 l for Folicur Xpert EC 240 og Amistar/Mirador hhv. ud fra 1,25 l for Orius Gold.
- 4) Triazolregler sætter yderligere begrænsninger for dosis og antal behandlinger.

Emneord

- Bekæmpelse
- Frøafgrøder
- Fungicider
- +1

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 2028 2695

Støttet af



Frøafgiftsfonden

SEGES Innovation P/S	Tlf.	8740 5000
Agro Food Park 15	Fax.	8740 5010
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk