

Planter

Effekt af svampemidler i frøgræs - 2024

Se oversigt over godkendte midler og effekter.

Analyse

12. november 2020
Opdateret 06. marts 2024



I tabel 1 ses en oversigt over godkendte svampemidler i frøgræs og deres effekt vurderet ud fra forsøg ved Aarhus Universitet og landsforsøgene. Nogle midler er godkendt i "frøgræs", mens andre kun er godkendt i de nævnte frøgræsarter. For følgende midler er godkendelsen baseret på en såkaldt "mindre anvendelse": Balaya, Entargo og Pictor Active (Entargo + Comet Pro). Firmaet anbefaler tilsætning af 0,2 l/ha Agropol til Pictor Active.

Vær opmærksom på triazolreglerne. Se også [Der er kommet nye triazolregler](#). Af midlerne i tabel 1 er Balaya, Folicur Xpert EC 240 og Orius Gold omfattet af reglerne.

Vær opmærksom på, at Balaya kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson og senest 31. maj. Orius Gold må senest anvendes i vækststadiet 55, mens de øvrige midler i tabel 1 må anvendes til vækststadiet 69. For Entargo er der dog ingen sprøjtefrist. Vær opmærksom på, at der skal være mindst 21 dage mellem to behandlinger med Comet Pro. Af tabel 1 fremgår, at også andre midler har krav til minimum afstand mellem 2 behandlinger. Frøgræshalm behandlet med midlerne i tabel 1 må ikke opfodres.

Se også: [Svampebekæmpelse i alm. rajgræs til frø](#)

Tabel 1. Oversigt over godkendte svampemidler i frøgræs og effekter.

0-3 skala, hvor – = ingen effekt, 1 = svag effekt, 2 = middel effekt og 3 = god effekt.

Middel	Virkemekanisme	Godkendt i	Normaldosis, l/ha	Maks. antal behandlinger og evt. krav til afstand mellem 2 beh.	Sortrust, brunrust, gulrust	Kronrust, engrapgræsrust
					Effekt	
Amistar/Mirador	Strobilurin	Frøgræs	0,5 ³⁾	Maks. 0,5	xx	x



Middel	Virkemekanisme	Godkendt i	Normaldosis, l/ha	Maks. antal behandlinger og evt. krav til afstand mellem 2 beh.	Sortrust, brunrust, gulrust	Kronrust, engrapgræsrust
					Effekt	
				l/ha/sæson		
Balaya	Triazol+ strobilurin	Frøgræs	1,5 ⁴⁾	1, senest 31. maj	xx(x)	xx(x)
Comet Pro	Strobilurin	Rajgræs, strandsvingel, engrapgræs, hundegræs, engsvingel, rødsvingel, bakkesvingel	1,25	2, 21 dage	xx	xx
Entargo	SDHI	Frøgræs	0,7	1	-	-
Folicur Xpert EC 240	Triazol	Frøgræs	0,5 ^{3) 4)}	2, 14 dage	xxx	xxx
Orius Gold	Triazol	Frøgræs	0,4-0,6 ^{3) 4)}	2	xxx	xxx
Pictor Active (Entargo + Comet Pro)	SDHI+ strobilurin	Frøgræs	1,0 eller 2 x 0,5	2, 7 dage	xx	xx
Propulse (fluopyram+prothioconazol)	SDHI + azol	Frøgræs	0,5	1	xx	xx
Talios	(proquinazid)	Alm. rajgræs, rød- og strandsvingel	0,25	2, 14 dage, maks. 0,25 l/ha/sæson	-	-

1) Bladpletsvampe dækker over de mest udbredte arter, men for nogle bladpletsvampe kan effekterne være anderledes.

2) Ukendt om der er fuld effekt på meldug af strobiluriner.

3) Effekt vurderet ud fra 1,0 l for Folicur Xpert EC 240 og Amistar/Mirador hhv. ud fra 1,25 l for Orius Gold.

4) Triazolregler sætter yderligere begrænsninger for dosis og antal behandlinger.

Emneord

Bekæmpelse

Frøafgrøder

Fungicider

+1

Publiceret: 12. november 2020

Opdateret: 06. marts 2024

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent

SEGES Innovation P/S

gcn@seges.dk

+45 2028 2695

Støttet af

Froafgiftsfonden

SEGES Innovation P/S Tlf. 8740 5000
Agro Food Park 15 Fax. 8740 5010
8200 Aarhus N Email info@seges.dk