

Malkning

Er råmælken af dårlig kvalitet, prioriter da malkning af koen hurtigt efter kælvning, så antistofferne sikres. Hygiejneniveauet ved malkning af nykælvere skal være mindst lige så højt, og gerne endnu højere, inden råmælken udmalkes. Husk pattedyb efter malkning. Der kan med fordel bruges en god forskum med desinfektion til aftørring af yveret. Husk altid at skifte til rene handsker, inden råmælken håndteres.

Opbevaring

Den nymalkede råmælk skal nedkøles/ nedfryses med det samme for at undgå ophobning af bakterier i råmælken. Skal man bruge råmælken samme dag, kan man nedkøle i køleskab. Skal råmælken gemmes til senere brug, skal den i fryseren. Frys ikke større mængder end 4 liter pr. portion, da det da kan tage for lang tid om at tø op.

Udfodring

Tid er en meget vigtig faktor for kalvens immunforsvar. For hver time der går, optager kalven mindre antistof fra råmælken.

Man kan med fordel bruge en suttespand eller en sutteflaske. Hav en blød sut til disse, som udelukkende bruges til råmælk. En blød sut kan hjælpe med at sikre, at kalven ikke bliver træt, inden al råmælken er drukket. Det er vigtigt, at denne vaskes og desinficeres mellem hver brug. Er kalven for svag til at drikke selv, kan den tildeles råmælken med sonde. Raske og friske kalve bør ikke fodres med sonde. Råmælken kommer i vommen frem for løben, når vi sondefodrer, og fordøjelse af råmælk og mælk kan kun ske i løben på den nyfødte kalv. Desuden vil der altid ligge lidt mælk tilbage i vommen, som vil irritere og give mavepine. Er kalven frisk og på benene, kan man med fordel have et ophæng til suttespanden eller sutteflasken i kælvningsboksen, så kalven selv kan stå og drikke, uden man behøver at holde flaske eller spand.


Rengøring

Udstyr, man vil desinficere, skal altid være tørt og ikke mindst rent, inden man desinficerer. Er udstyret ikke det, vil desinfektionen være nyttesløs og spild af tid og desinficeringsmiddel.

Sådan håndterer du
råmælk
rent og sikkert

Forslag til protokol i kælvningsafdelingen/
kalvekøkkenet/kalvestalden

Kalve-nummer	Kælv-nings-tidspunkt	Ko-nummer	Ko malket kl.	Kalv råmælk kl.	Brix% råmælk fodret	Liter råmælk fodret	Metode fodret	Hvem har fodret?	Var udstyr rent?



VEJLEDNING RÅMÆLK

Malkning

Malk koen så hurtigt som muligt efter kælvning (<6 timer) ved lige så høj hygiejne som ved almindelig malkning (handsker og rent yver). Hvis det er muligt, malk koen i kælvningsboksen for at undgå flytning.

- **SE MERE** på bagsiden af pjecen.

Mål Brix% på den udmalkede mælk, og noter kvalitet og konummer på beholderen og i protokol. Råmælken skal gerne måle >22% for at være af god nok kvalitet.



Opbevaring

Opbevar råmælken i en ren og lufttæt beholder, og nedkøl/nedfrys med det samme

- **SE MERE** på bagsiden af pjecen.




Udfodring

Giv kalven råmælk så hurtigt som muligt efter fødsel (inden for 2 timer). Hvis råmælken er frossen, optø den i vandbad i ca. 30 min. Temperaturen på vandet skal være omkring 45 °C. Tjek, at mælken har korrekt temperatur (39 °C) inden udfodring.

- **SE MERE** på bagsiden af pjecen.


Giv råmælken (3-4 liter) med en sut til kalven.

- **SE MERE** på bagsiden af pjecen.



Rengøring

Rengør altid fyldestation, spande, sutteflaske/suttespand eller sonde efter hver brug.



Skyl i lunkent vand lige efter brug for at fjerne alle mælkerester.



Brug en god basisk sæbe i lunkent vand.



Lad udstyret lufttørre.

- **SE MERE** på bagsiden af pjecen.

Desinficer udstyret (evt. med VirkonS i en 2% opløsning), når det er helt tørt, og lad det tørre igen.



Opbevaring

Opbevar sutteflaske/suttespand og sonde, der bruges ved råmælksfodring, i et rent lukket skab eller i fryseren mellem hver brug.

