

Bluetongue i Danmark. Efterår 2024

Erik Rattenborg
Dyrlæge, Ph.d.
SEGES Innovation


STØTTET AF

Kvægafgiftsfonden

STØTTET AF

Mælkeafgiftsfonden

Mitteforekomst i Danmark. Kilde: myggetal.dk



Obsoletus 2013	Obsoletus 2017	Obsoletus 2021
Obsoletus 2014	Obsoletus 2018	Obsoletus 2022
Obsoletus 2015	Obsoletus 2019	Obsoletus 2023
Obsoletus 2016	Obsoletus 2020	Obsoletus 2024

Bluetongue virusudvikling og viræmi

Mitter

- Fra optagelse i mitte til mulig overførelse: 6-8 døgn (eller længere ved lave temperaturer). Minimum temperatur 11-13°C.

Inkubationstid

- I gns. 5-8 dage, men op til 20 dage.

Virus i blodet i drøvtyggere

- Kvæg: gns. 35 dage (maks. 50-(60) dage)
- Får: gns. 18 dage (maks. 28-(47) dage)
- Ged: 25 dage (maks. 29-(32) dage)

Forebyggelse og behandling


Forebyggelse

- Vaccination (typespecifik)
- Undgå mitteangreb:
 - Tag dyrene på stald i skumringen og om natten
 - Fluemidler ???


Behandling

- Smertestillende
- Behandling af evt. tilstødende infektioner
- Aflivning

Udbrud i Danmark 2024. Siden 9. august.




Efter uge 1




Efter uge 2




Efter uge 3




Efter uge 4




Efter uge 5



After week 2 -2025 (Nu)



Fordeling mellem husdyrarter pr. 17. januar 2025




Malkekvægsbesætninger

Øko: 137

Konv.: 319

Antal smittede ejendomme: 1.037

Udvikling i antallet af tilfælde




Overvågning af tankmælk dec. 24

Procent ikke-negative

I alt 164 prøver

Ikke-negative =
positive + inkonklusive



Hvordan med 2025?



- Hvor længe virker vaccinen? Hvor god er vaccinen? Bliver den godkendt?
Det ved vi ikke pt.
- Overvintrer smittede mitter?
Det er ikke sandsynligt.
- Starter smitten fra kalve, der fødes til foråret af smittede mødre?
Det har lille sandsynlighed
- Kommer smittede mitter igen sydfra?
Det er sandsynligt. Afhænger af immunitet i Tyskland og Holland.

**Tænk også på
mund- og klovesyge !!!!**

Udbrud i Tyskland

- MKS konstateret fredag den 10. januar 2025
- Besætning med 14 vandbøfler i naturområde ved Berlin konstateret smittet
- Tre bøfler døde af sygdommen. Resten aflivet samme dag
- Oprindelig mistanke om bluetongue
- Smitten muligvis sekundær, d.v.s. påført af et andet dyr (vildsvin?, hjort?)
- Smitten sandsynligvis sket allerede medio december
- MKS virus type O. Ligner meget en subtype, der findes i Tyrkiet

Geografisk placering



Symptomer på mund- og klovesyge

- **Hos kvæg, skal du være opmærksom på følgende symptomer:**
- Feber
- Savlen/smasken
- Blære eller sår på tungen, mundhule, muleplader, klovspalten eller patter.
- Nedsat mælkeydelse.

Symptomer på mund- og klovesyge

Symptomerne hos får er ofte langt mindre tydelige. Det du skal holde øje med er:

- Savlen
- Pludseligt opstået svær halthed
- Foretrækker at ligge ned
- Står i en krummet position med bagbenene understillede og er uvillige til at bevæge sig
- På overgangen mellem klov og hud kan der forekomme blærer. Når de brister, bliver hornet adskilt fra underliggende væv, og pelsen omkring hoven forekommer fugtig.
- Sjældent blærer i munden. Hvis de er der, er det på tandkødet og eventuelt på tungen.

Mund- og klovesyge (fra EUfmd)



Unruptured vesicles on the tongue

Mund- og klovesyge (fra EUfmd)

