

Planter

## Ukrudtsbekæmpelse i ærter

Bekæmpelse af ukrudt i ærter kræver god timing for at opnå sikker effekt, der kan sikre mod høstbesvær og opformering af ukrudt.

Manual Opdateret Kl. 09:12

Målet er at bekæmpe ukrudt tilstrækkeligt effektivt til at eventuelt restukrudt ikke bliver til gene ved høsten, eller at der sker en uhensigtsmæssig opformering af ukrudt. Udbyttedmæssigt betyder ukrudt ikke så meget i ærter og i forsøg er nettomerudbyttet sjældent positivt. På arealer med en lille til moderat ukrudtsbestand kan der sættes på en enkelt behandling med ca. halv normaldosering - svarende til den ene splitbehandling. Ved stor ukrudtsbestand vil der være behov for at gennemføre en splitsprøjtning.

Glyphosat må ikke anvendes i ærter til konsum. I ærter til foder kan glyphosat anvendes til pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt. Glyphosat må ikke anvendes på fremavlsarealer eller arealer med udlæg.

Firmaet BASF oplyser, at Basagran SG afløser Fighter 480 på det danske marked. I vækstsæson 2025 vurderes der at være produkt af begge midler, som hver især kan dække ca. halvdelen af forbruget i 2025.

### Timing af bekæmpelse af ukrudt i ærter

Bekæmp ukrudtet i kimbladsstadiet uden hensyn til ærternes størrelse. Mod vanskelige arter som snerlepilleurt, vejpilleurt, raps og gul okseøje er det vigtigt, at ingen af ukrudtsplanterne når at udvikle løvblade inden sprøjtning. Afsæt et 2-3 m langt ubehandlet sprøjtevindue, så det efter kort tid er muligt at vurdere effekten af 1. sprøjtning. Det kan være vanskeligt at vurdere effekten af første sprøjtning uden at kunne sammenligne med et ubehandlet felt.

Hvis nyt ukrudt spirer senere frem i en mængde, der udløser behov for bekæmpelse, sprøjtes der igen 7-10 dage senere.

Hvis det rette tidspunkt for en tidlig behandling bliver forpasset, er Fenix + Fighter 480/Basagran SG den mest sikre løsning. En sprøjtning med Fenix + Fighter 480/Basagran SG kan også være aktuel, hvis fremspiringen af ukrudt på grund af tørre forhold efter såning sker over en lang periode.

**Centium 36 CS**, **Fenix** og **Novitron** er godkendt i ærter før fremspiring. Ved god jordfugtighed kan der ved relativ høj dosis opnås god effekt, men sprøjtning før fremspiring er i forhold til sprøjtning efter fremspiring mere usikker under tørre forhold.

**Lentagran 45**, som anvendes efter fremspiring, kan bekæmpe sort natskygge, hvis knopper ikke tolereres i konservesærter. Lentagran har derudover god effekt mod bl.a. brandbæger, burrenerre, fuglegræs, hyrdetaske, jordrøg, kamille, hvidmelet gåsefod og tvetand. Der



er nogen effekt mod bleg- og ferskenpileurt, snerlepileurt, stedmoder, storkenæb og ærenpris. Endelig har Lentagran svag effekt mod raps og vejpileurt.

Lentagran 45 er i Sverige afprøvet i en splitstrategi med 0,35 l Fenix + 0,5 kg Lentagran 45 pr. ha i afgrødens stadiet 11 efterfulgt af 0,5 kg Lentagran 45 pr. ha ca. 10 dage senere. Det er ikke muligt at sammenligne effekten af løsninger, som er afprøvet i Danmark. Men det vurderes, at effekten på tværs af ukrudtsarterne kan sammenlignes med splitsprøjtning med Stomp + Fighter 480/Basagran SG eller Fenix + Fighter 480/Basagran SG.

## Løsningsforslag og effekttabel

- [Se løsningsforslag i ærter uden udlæg \(Middeldatabasen\)](#)
- [Effekttabel for ukrudtsmidler i ærter](#)

## Udlæg

I ærter med udlæg af græs/kløvergræs eller frøgræs er Fighter 480/Basagran SG og Stomp CS skånsomme. For at undgå, at Stomp påvirker udlægget, skal det sås, så frøene er dækket.

Se løsningsforslag i Middeldatabasen:

- [Ærter med udlæg af kløvergræs](#)
- [Ærter med udlæg af rødsvingel](#)
- [Ærter med udlæg af engrapgræs](#)

Hverken kløver- eller græsudlæg tåler Fenix.

## Tilpas dosis efter vækstforholdene

God jordfugtighed giver ideelle virkningsbetingelser. Det er optimalt med 15-20 °C ved brug af bentazon-midler (Fighter 480/Basagran SG), men erfaringerne viser, at der med de relevante blandinger opnås god effekt, selv om temperaturen er betydeligt lavere.

Planternes vokslag afhænger af de aktuelle vejrforhold. Såvel afgrøde som ukrudt udvikler et tyndt vokslag, når vækstbetingelserne er gode (gejl vækst, grødevejr, fugtig jord, høj luftfugtighed). Derimod udvikles et kraftigt vokslag på afgrøde og ukrudt, når vækstbetingelserne er mindre gunstige (langsom vækst, tør jord, lav fugtighed, køligt, blæsende vejr). Dosis kan med fordel tilpasses de nævnte forhold. Under gejl vækstforhold kan dosis være lav, mens dosis bør være højere, når væksten er langsom under tørre vækstforhold.

## Sårede ærter

Hvis vokslaget bliver beskadiget (mange gnav af bladrandbiller, vindslid/jordfygning eller for sen tromling), er ærterne mere følsomme over for ukrudtssprøjtning, fordi ukrudtsmidlerne hurtigt trænger ind i planterne. Udsæt i givet fald sprøjtningen nogle dage.

## Bladrandbiller i ærter

Bekæmpelse af ukrudt og bladrandbiller kan kombineres.

## Blandingstabel

Blandingstabel for midler i markærter kan findes i [Middeldatabasen](#).

Publiceret: 11. marts 2020  
Opdateret: 12. marts 2025

## Vil du vide mere?



### Poul Henning Petersen

Landskonsulent  
SEGES Innovation P/S

[php@seges.dk](mailto:php@seges.dk)  
+45 2010 2297



### Carsten Fabricius

Afdelingsleder  
SEGES Innovation P/S

[cars@seges.dk](mailto:cars@seges.dk)  
+45 2924 5175



### Gitte Skovgaard

Landskonsulent  
SEGES Innovation P/S

[gisk@seges.dk](mailto:gisk@seges.dk)



### Jens Erik Jensen

Chefkonsulent  
SEGES Innovation P/S

[jnj@seges.dk](mailto:jnj@seges.dk)  
+45 2171 7706

## Støttet af

Planteafgiftsfonden

8200 Aarhus N

Email [info@seges.dk](mailto:info@seges.dk)