

Græs ▾

Indstillinger for Sortsvalg

Programmet håndterer sorter af alm. rajgræs og hybridrajgræs. Sorterne er afprøvet i forskellige tidlighedsgrupper med tilhørende måleblending som reference. Der skal derfor vælges en tidlighedsgruppe. Det er muligt at se resultaterne som gennemsnit af 1.-2. brugsår samt 1.-3. brugsår.

Art

Alm. rajgræs ▾

Tidlighed

Middeltidlig ▾

Varighed

3 brugsår ▾

[Næste](#)

SEGES Innovation, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N tlf.: 8740 5000.

Spørgsmål omkring login og drift rettes til SEGES Kundecenter på: Telefon 7015 5015. Email: kundecenter@seges.dk


Faglige spørgsmål til værktøjet kan rettes til:

- Martin Mikkelsen mam@seges.dk / 2028 2694
- Torben S. Frandsen tsf@seges.dk / 2333 9789
- Henrik Martinussen hnm@seges.dk / 2983 3525
- Rudolf Thøgersen rut@seges.dk / 3092 1743

Baseret på forsøgsresultater for græs fra 2010-2021 og for majs fra 2016-2021.
Opdateres med nye resultater fra 2022 omkring 1. dec. 2022


Udvikling af sortsvalg græs

- Afprøvning af sorter i forskellige afprøvningsperioder – udligning af effekt af høstår



Arter

- Strandsvingel og rajsvingel opfører sig anderledes end alm. rajgræs (måleblanding) og vi har for få observationer



Fælles platform for beslutningsstøtte til sortsvalg

- P.t. for sorter af majs, alm. rajgræs og hybrid rajgræs

SEGES
INNOVATION

StartTorben Frandsen!Log ud dansk (Danmark) ▾

Græs ▾
Majs
Græs

Indstillinger for sortsvalg

Programmet håndterer sorter af alm. rajgræs og hybridrajgræs. Sorterne er afprøvet i forskellige tidlighedsgrupper med tilhørende måleblanding som reference. Der skal derfor vælges en tidlighedsgruppe. Det er muligt at se resultaterne som gennemsnit af 1.-2. brugsår samt 1.-3. brugsår.

Art	Alm. rajgræs ▾
Tidlighed	Middeltidlig ▾
Varighed	3 brugsår ▾

Næste

Valg af art, tidlighed og varighed

Græs



Indstillinger for Sortsvalg

Programmet håndterer sorter af alm. rajgræs, hybridrajgræs og rajsvingel. Sorterne er afprøvet i forskellige tidlighedsgrupper med tilhørende måleblanding som reference. Der skal derfor vælges en tidlighedsgruppe. Det er muligt at se resultaterne som gennemsnit af 1.-2. brugsår samt 1.-3. brugsår.

Art

Vælg art fra listen



Tidlighed

Vælg tidlighed fra listen



Varighed

Vælg varighed fra listen



Næste

Afgræns udvalg af sorter

Afgræns antallet af sorter for græs

Antallet af sorter kan afgrænses ved at til/fravælge yderst til venstre. Udbytte- og kvalitetsegenskaber er modelberegnete værdier på baggrund af alle forsøgsresultater med sortsafprøvning af græsmarksplanter siden 2010

Marker Alle

Marker Ingen

Tilbage

Næste

Tilpas visning ▼

↑ Sort	Ploidi	Udbytte, a.e. NEL20 ialt. Forholdstal	Fk, ialt, organisk stof (korrigeret)	Sukker, ialt, % af tørstof	Råprotein, ialt, % af tørstof	NDF, ialt, % af tørstof	FK, ialt, NDF	
☐ AberGreen	D	93	77.5	158	145	467	72.9	
☐ AberWolf	D	103	77.6	137	155	477	74.5	
☐ Abosan 1	D	106	77.3	137	161	458	72.7	
☐ AstonHockey	T	99	78	148	152	461	74.3	
☐ Barcampo	T	103	77.8	125	151	480	75.6	
☐ Barfamos	T	104	79.1	131	166	461	76.9	
☐ Bargizmo	D	104	77.4	137	153	482	74.5	
☐ Barnauta	T	101	79	136	166	439	75.2	
☐ Borsato	D	104	77.2	135	161	465	72.8	

Udvælg andre måleparametre

Forsøgsresultater for udvalgte sorter - Græs

Ved at klikke på "tilpas visning" over tabellen er det muligt at tilpasse hvilke egenskaber der skal vises i tabellen. Det er også muligt at få vist spredning og antal observationer der ligger bag data. Spredningen angiver et interval, hvor der er 66 pct. sandsynlighed for, at parameteren ligger indenfor.
Data kan eksporteres data til Excel.

Tilpas visning 

Tilbage

Næste

Valgmuligheder

☒ Vis spredning for udbytte- og kvalitetsparametre ☐ Vis antal afprøvninger

☐ Udbytte, ialt, hkg tørstof. Forholdstal ☐ Udbytte, ialt, hkg råprotein. Forholdstal ☒ Udbytte, a.e. NEL20 ialt. Forholdstal ☒ Fk, ialt, organisk stof (korrigeret)

☐ Tørstof, ialt, % af råvare ☒ Sukker, ialt, % af tørstof ☐ Råaske, ialt, % af tørstof ☒ Råprotein, ialt, % af tørstof ☒ NDF, ialt, % af tørstof

☐ Træstof, ialt, % af tørstof ☒ FK, ialt, NDF ☐ FV, ialt, Fyldeværdi /kg tørstof ☐ AAT20, ialt, g/kg TS ☐ PBV20, ialt, g/kg TS ☒ NEL20, ialt, MJ/kg TS

 Eksporter data til Excel

↑ Sort	Udbytte, a.e. NEL20 ialt. Forholdstal	Fk, ialt, organisk stof (korrigeret)	Sukker, ialt, % af tørstof	Råprotein, ialt, % af tørstof	NDF, ialt, % af tørstof	FK, ialt, NDF	NEL20, ialt, MJ/kg TS
AberGreen	93	77.5	158	145	467	72.9	6.21
AberWolf	103	77.6	137	155	477	74.5	6.26
Abosan 1	106	77.3	137	161	458	72.7	6.19

Bedriftsspecifikke oplysninger

Besætningsoplysninger

Race	Stor	Ydelsesniveau, kg EKM	12000
Med opdræt	Ja	Kvier per årsko	0,8
Mælkepris, kr./kg EKM	4,2		

Majshelsædsensilage

Græs/majs forhold	70/30
Vælg Majskvalitet	Høj
NEL20, MJ/kg tørstof	6,45
NDF, g/kg tørstof	347
FK organisk stof, %	79,8

Kløvergræsensilage

Græsensilage, kg tørstof / kvie / dag	2,5	Græsensilage, dyrkningsomkostninger, kr/ha	10288
Græsensilage, Udbytte, NorFor, FEN/ha	10000	Alternativ afgrøde (f.eks. vårbyg), DB, kr/ha	3600

Økonomisk merværdi

Økonomisk værdi af de udvalgte sorter for græs

Her kan du se en sammenligning af den økonomiske værdi pr. årsko for de valgte sorter og med de valgte forudsætninger. Værdien er angivet i forhold til dyrkning og fodring med gennemsnittet af de seneste 2 afsluttede målesortsblandinger. Værdien er en sum af omkostninger til græsdyrkning, mistet DB II fra alternativ afgrøde, omkostninger til kraftfoder og værdien af ændret mælkeydelse. Hvis valgte sorter ikke fremgår af oversigten skyldes det, at der ikke kan optimeres en foderration for valgte kombination af race, ydelse, græs/majs forhold samt fordøjelighed af majs.

Tilbage


Tilpas visning ▲

- ☒ FK, ialt, NDF☒ Fk, ialt, organisk stof (korrigeret)☐ FV, ialt, Fyldeværdi /kg tørstof☒ NDF, ialt, % af tørstof☒ NEL20, ialt, MJ/kg TS☐ PBV20, ialt, g/kg TS☐ Råaske, ialt, % af tørstof☒ Råprotein, ialt, % af tørstof
- ☒ Sukker, ialt, % af tørstof☐ Tørstof, ialt, % af råvare☐ Træstof, ialt, % af tørstof☐ AAT20, ialt, g/kg TS☒ Udbytte, a.e. NEL20 ialt. Forholdstal☐ Udbytte, ialt, hkg råprotein. Forholdstal☐ Udbytte, ialt, hkg tørstof. Forholdstal


 Eksporter data til Excel

↑ Sort	Ploidi	Areal pr. årsko, ha	Omkostn... til græsdyrk... kr./årsko	DB alternativ afgrøde, kr./ årsko	Omkostn... til kraftfoder, kr./årsko	Værdi af ændret mælkeyd... kr./årsko	Total, kr./ årsko	Udbytte, a.e. pr. ha Forholdstal	Udbytte, hkg tørstof Forholdstal	FK, ialt, NDF	Fk, ialt, organisk stof (korrigeret)	NDF, i % af tø
AberGreen	D	0.226	498	-174	-378	-24	30	92	92	72.9	77.5	46.7
AberWolf	D	0.202	251	-88	-359	0	195	103	103	74.5	77.6	47.7
Abosan 1	D	0.194	178	-62	-416	-74	226	107	106	72.7	77.3	45.8
AstonHockey	T	0.214	377	-132	-416	91	261	99	98	74.3	78	46.1
Barcampo	T	0.2	236	-83	-323	46	216	104	103	75.6	77.8	48
Barfamos	T	0.212	354	-124	-525	296	591	104	101	76.9	79.1	46.1
Bargizmo	D	0.198	213	-75	-312	-49	125	104	103	74.5	77.4	48.2
Barnauta	T	0.22	443	-155	-613	280	605	101	99	75.2	79	43.9
Borsato	D	0.198	210	-74	-404	-99	168	105	104	72.8	77.2	46.5
Briant	T	0.197	206	-72	-413	153	432	108	107	75.9	78.3	47.4
Cangou	D	0.193	165	-58	-258	-235	-84	104	105	73.4	76.7	48.5

Udbytte og merværdi



FK org. stof og merværdi



Status

- Beregning af usikkerhed på økonomisk merværdi undervejs
- Lancering primo 2023