

Forud for pløjefri etablering af vårafgrøder er småt græsukrudt nemmest at ramme med glyphosat, når efterafgrøden om foråret er klappet sammen. Foto: Poul Henning Petersen.



Eksperterne



Carsten Fabricius



Poul Henning Petersen,
Seges Innovation

Håndtering af efterafgrøder før vinter

Af Carsten Fabricius og Poul Henning Petersen, landskonsulenter, Seges

Efterafgrøder skal samle mest muligt kvælstof og forhindre udvaskning - og kan derfor med fordel ligge vinteren over.

Efterafgrøder bør kun termineres om efteråret, når hensynet er at bekæmpe kvik, eller der skal vinterpløjes på lerjord.

Pløjning

En god pløjning om efteråret eller foråret er en effektiv måde at terminere alle typer efterafgrøder. Ifølge Jens Iversen, Ploveksperten, er årsagen til for dårlig

nedpløjning ofte, at forpløve er placeret for langt bagud eller skal flyttes 3-4 centimeter mod land.

Er der en stor biomasse forud for efterårsplojning, kan det være en fordel at tage en tur med brakpudseren eller at tromle.

For græsefterafgrøder vil det ofte være en god ide at nedvisne foragre inden pløjning, så der ikke sker gengroning i sammenpløjningen. Ved efterårsplojning kan nedvisningen også ske om foråret før såbedstilberedning.

I korn er eventuelt overlevende olieræddiker let at bekæmpe.

Kvik skal bekæmpes, mens planterne er i vækst, så det skal ske ved første lejlighed efter den tilladte dato for destruktions. Om foråret vil kvikken alt for sent være i vækst til at kunne transportere glyphosat ud i udløberne.

Pløjefri dyrkning

Ved pløjefri dyrkning skal marken være fri for ukrudt og spildkorn før såning af afgrøden om foråret. Derfor vil der stort set

altid være behov for at anvende glyphosat om foråret. Også selv om der eventuelt er brugt glyphosat om efteråret.

Særligt olieræddike bliver ofte kraftigt udviklet, så det ikke er muligt at ramme de små græsser med sprøjtetråberne under det kraftige bladdække. Det er langt mere sikkert at få dråberne ned og ramme alt græs om foråret, hvis bladene på efterafgrøden er klappet sammen.

Kvik vil allerede være i vækst, når efterafgrøden bliver etableret. Derfor er det lettere at ramme kvik end småt græsukrudt nede i bunden af efterafgrøden. Desuden er det ikke nødvendigt at ramme alle skud for at få glyphosat ud i de lange udløbere, som hver især vil have mange skud. I de nye godkendelser af glyphosamidler er der restriktioner på antal behandlinger, så visse produkter kun må anvendes én gang pr. sæson. Indtil videre gælder det for Roundup PowerMax og Roundup XL (afløser for Roundup Bio).

Sagen kort

- Når efterafgrøden har udført sin funktion med at samle kvælstof, skal den på den ene eller anden måde håndteres, så marken bliver klar til næste afgrøde.
- Fra 20. oktober eller senere (afhængig af efterafgrødens såtidspunkt og type) er det muligt at destruere sin efterafgrøde.
- Glyphosat om efteråret er kun aktuelt, når der er behov for at bekæmpe kvik. Tokimbladet rodokrudt vil ofte være ude af vækst, når efterafgrøden må destrueres.