

Planter

Registreringsnet uge 35: Skadegørere i raps og sukkerroer

Bekæmpelse rettet mod larver af rapsjordlopper er tidligst aktuel fra 4-5 løvbladstadiet. Der er meldt om angreb af kålbladhvepselarver i nogle marker.

Analyse | 30. august 2022



1. registrering af rapsjordlopper

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen på ca. 50 lokaliteter via gule fangbakker, og de første registreringer er foretaget. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod larver.

Der er sat 2 fangbakker ud pr. mark, og i år er som noget nyt yderligere sat 2 fangbakker ud, som er nedgravet i jordoverfladen. Ifølge tyske undersøgelser fanges der i gennemsnit ca. 40 procent flere rapsjordlopper ved nedgravning af bakkerne i jordoverfladen, da flere biller her lander i bakkerne. Fangsterne i de to typer fangbakker er vist separat.

Der er pt. i de fleste tilfælde kun fundet relativt få rapsjordlopper i fangbakkerne. Bekæmpelse rettet mod larver er endnu for tidligt. Rapsen er i vækststadiet 10-14 (kimblade udviklet til 4 løvblade). Evt. bekæmpelse rettet mod larver er ret fleksibelt og anbefales tidligst fra 4-5 løvbladstadiet.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke i de runde fangbakker (radius 11 cm) indenfor tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg. Denne vejledende bekæmpelsestærskel er fastsat ud fra fangster i fangbakker, som ikke er nedgravet.

Behovet for at udføre bekæmpelse rettet mod bladnav i de tidlige vækststadier skal man se sig til. Bekæmpelse er aktuel indtil ca. 4 løvbladstadiet ved 10 procent bortgnavet bladareal, dog 5 procent bortgnavet bladareal ved angreb i kimbladstadiet eller ved svag vækst. 0,1-0,15 kg pr. ha Lamdex eller 0,05-0,075 kg pr. ha Kaiso Sorbie anbefales til bekæmpelse rettet mod bladnav.

Meldinger om kålbladhvepse

Der er modtaget enkelte meldinger om angreb af kålbladhvepse i raps, der ved kraftige angreb kan afribbe bladene næsten totalt. Se foto 1-2. Angreb optræder som randangreb fra nabomarker med rapsstub eller i store dele af marken. Randbehandling eller behandling af hele marken kan derfor være aktuel.

Ingen midler har en specifik godkendelse mod kålbladhvepse, men 0,2 kg Lamdex eller 0,1 kg Kaiso Sorbie kan anvendes, hvis der samtidig er angreb af rapsjordlopper.





Foto 1. Gnav fra kålbladhvepselarver fotograferet 30. august 2022 af Anders Düring Jørgensen, VKST.



Foto 2. Kålbladhvepselarve fotograferet i tidligere år af Frederik Slorup, Grevinge, VKST.

2. registrering af agersnegle

I år bedømmes der i forbindelse med et CA-projekt også angreb af snegle i raps i ca. 20 pløjede marker og ca. 20 marker, hvor der praktiseres CA.

Der er pt. registreret i 23 marker, hvor der er angreb i 11 marker, men svage angreb i de fleste tilfælde (0,5-5,0 procent af marken angrebet). Der er spredt sneglekorn i 8 af markerne. Af de 23 marker er 5 marker CA-marker. Fra praksis er også meldt om tilfælde af angreb.



Foto 3. Stubmark med sneglegn på spildkorn fotograferet 26. august 2022 af Lars Andresen, VKST.

6. registrering af bladsvampe i sukkerroer

NBR og Nordic Sugar følger fra juli hver uge forekomsten af svampesygdomme i sukkerroer, og resultaterne kan også følges på registreringsnettet. Data og kommentarer opdateres hver torsdag.

I ubehandlede obs-parceller er rust fortsat i udvikling og udvikles i styrke over middel.

Udbredelse af meldug er stigende i ubehandlede parceller med stigende angreb på Østlolland og Falster og begyndende angreb også på Vest- og Østsjælland.

Hvis endnu ikke foretaget, er behandling nummer to fortsat aktuell i marker, der planlægges taget op fra midten af oktober eller hvor der bliver 6 uger mellem sidste behandling og optagning.

Rust har i år udviklet sig hurtigere på et tidligere tidspunkt. Ved bekæmpelse af rust er især timing vigtig. Derfor er det vigtigt, at behandling udføres ved meget svage angreb.

Lovgivningsmæssigt skal der være min. 21 mellem behandlingerne. Ved behandling på etablerede angreb bør dosis øges.

Se løsningsforslag på selve registreringsnet siden. Vær obs på, at dispensationen til Propulse kun gælder sukkerroer og ikke foder- og energiroer.

[Se registreringer i Registreringsnettet](#)

[Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2022](#)

[Se alle ugekommentarer til udviklingen af skadevoldere](#)

Emneord

[Registreringsnet/varsling](#)

[Skadedyr](#)

[Skadedyrsbekæmpelse](#)

[+2](#)

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES



gcn@seges.dk
+45 2028 2695

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES Innovation P/S	Tlf.	8740 5000
Agro Food Park 15	Fax.	8740 5010
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

