

Planter

Følg forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps

De første registreringer i ca. 30 vinterrapsmarker kan ses fra 14. marts. Bekæmpelse anbefales kun ved fangster over tærsklen i egne fangbakker og samtidig relativ høje temperaturer.

Viden om Opdateret 07. marts 2022



Behovet for at bekæmpe bladribbesnudebiller i vinterraps er generelt lavt. For at blive bedre til at vurdere behovet startede der i 2017 et registreringsnet. Der er i samarbejde med planteavlskonsulenterne igen i 2022 udstationeret gule fangbakker i ca. 30 vinterrapsmarker. Første aflæsning af fangster foretages 14.-15. marts, og udviklingen kan de følgende ca. 6 uger følges i [registreringsnettet](#).

Ultimo maj opgøres angrebsgraden af bladribbesnudebillelarver i et ubehandlet område omkring fangbakkerne, så forekomsten af biller kan relateres til larveangreb.

Bladribbesnudebillerne er det tidligste skadedyr i rapsen, og registreringsnettet starter derfor tidligt. Tidspunktet for bladribbesnudebillerne fremkomst er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12 °C. Ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15 °C og mere end 3 timers solskin optræder de mere talrigt.

Tærskel i gule fangbakker

Efter tyske angivelser er det svært at opgøre angrebsstyrken i marken, fordi bladribbesnudebillerne meget hurtigt lader sig falde til jorden ved den mindste berøring af planterne. I Tyskland anbefales det derfor at anvende gule fangbakker til at opgøre forekomsten og sammenholde fangsterne med temperaturforholdene. Bekæmpelse anbefales ved over 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. Der er ikke nogen bestemt tidsperiode for fangsterne. Ved bekæmpelsesbehov skal bekæmpelse tidligst udføres ca. 10 dage efter, at de første bladribbesnudebiller er observeret i fangbakkerne, da bladribbesnudebillerne ikke straks lægger æg. Bekæmpelse skal ske, før bladribbesnudebillerne lægger æg. I meget varmt vejr sker æglægning tidligere end efter 10 dage.

Det er vigtigt at bemærke, at bekæmpelsestærsklen ikke er sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Bekæmpelse af bladribbesnudebiller anbefales kun, såfremt der er udsat gule fangbakker i marken med fangster af bladribbesnudebiller over tærsklen. Der skal samtidig være relativ høje temperaturer.

Når bladribbesnudebillerne er aktive, er også mange snyltehvepse aktive. Snyltehvepsene parasitterer larver af rapsskadedyr bl.a. rapsjordlopper, hvilket nedsætter bestanden til efteråret (rapsjordlopper) og næste år (bladribbesnudebiller, glimmerbøsser).

Midler med effekt



Godkendte pyrethroider (excl. Mavrik) anbefales til bekæmpelse. Kaiso Sorbie har bladribbesnudebiller på etiketten, mens Lamdex kun må anvendes, hvis der samtidig er angreb af andre skadedyr. Normaldosen af Kaiso Sorbie mod bladribbesnudebiller er 0,15 kg/ha, hvilket mht. indhold af aktivstof svarer til 0,3 kg/ha Lamdex. Der er ingen erfaringer med nedsatte doser, men 0,1 kg Kaiso Sorbie/0,2 kg Lamdex anbefales.

Hvis der samtidig er behov for bekæmpelse af glimmerbøsser, skal der anvendes en blanding af to midler, da pyrethroider (excl. Mavrik) ikke har effekt mod glimmerbøsser grundet resistensudvikling hos glimmerbøsser mod pyrethroider.


Mod glimmerbøsser anbefales kun Avaunt 150 EC og Mavrik. Godkendelsen for Avaunt 150 EC er ikke fornyet, og midlet må kun anvendes og opbevares indtil 19. september 2022.

Snudebille med rødgule fødder

Bladribbesnudebiller ligner skulpesnudebiller, men har rødgule fødder og en hvidlig plet på ryggen. Bladribbesnudebiller er 3-4 mm lang og har en karakteristisk lang snude. Larverne er ca. 3 mm, lemmeløse og hvide med brunt hoved og ligger tit i c-form. De kan findes inde i stænglerne i maj. Ultimo maj er et godt tidspunkt at undersøge stænglerne for evt. larveangreb. Se billeder nedenfor.



Bladribbesnudebille i gul fangbakke. Bemærk de rødgule fødder.



Bladribbesnudebille i gul fangbakke. Bemærk den lyse plet på ryggen.



Ultimo maj er et godt tidspunkt at flække rapstænglerne på og undersøge dem for evt. larver af bladribbesnudebiller. Foto: Günter Klingenhagen, LWK-NRW.

Emneord

Insekticider

Registreringsnet/varsling

Skadedyrsbekæmpelse



Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 2028 2695

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES Innovation P/S	Tlf.	8740 5000
Agro Food Park 15	Fax.	8740 5010
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

