

Planter

Bekæmpelse af fritfluer i sent sået havre

Havre i 1,5-2 bladstadiet er følsom for angreb ved samtidig flyvning og varmt og tørt vejr.

Viden om

Sent sået havre er udsat for evt. angreb af fritfluer. Tidspunktet for flyvning af 1. generation fritfluer kan følges via en graddagemodel, som kan følges på [Følg den aktuelle risikovurdering for angreb af fritfluer i havre og majs](#).

Bekæmpelse kan være aktuel i sent sået havre og evt. vårhvede, mens bekæmpelse kun sjældent er nødvendig i majs. Graddagemodellen siger kun noget om forventet tidspunkt for forekomst af 1. generation fritfluer og siger desværre ikke noget om angrebsstyrken. Evt. bekæmpelse er aktuel, når kurven når op i det gule felt (70 graddage, begyndende flyvning).

Fritfluerne er især aktive og lægger mange æg, når det er varmt og tørt. De optimale betingelser er ved 20° C, mens 12 °C er minimum.

Kun afgrøder i 1,5- 2 bladstadiet er følsomme for evt. angreb af 1. generation fritfluer. Er planterne forbi 3-bladstadiet, er planterne ikke længere attraktive for æglægning. Vårsæd, græs og majs kan angribes. Angreb ses hyppigst i havre, hvor bekæmpelse kan være aktuel ved overskridelse af temperatursummen, såfremt der samtidig er gode betingelser for flyvning af fritfluer (varmt og tørt),



og havre er i 1,5-2 bladstadiet. I de øvrige afgrøder ses betydende angreb sjældent, og bekæmpelse anbefales ikke. Flyvningen forventes at vare i ca. to til tre uger.

Ved angreb af fritfluens larve i havre bliver hjerteskuddene gule. Strækningsvæksten udebliver, og planterne får en lav vækst med mange sideskud.

Til bekæmpelse i havre kan anvendes 0,25 kg **Lamdex**.

Emneord

Havre

Skadedyr

Skadedyrsbekæmpelse

Publiceret: 20. maj 2016

Opdateret: 02. maj 2023

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 2028 2695

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES Innovation P/S	Tlf.	8740 5000
Agro Food Park 15	Fax.	8740 5010
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk