

Tæt på DIN økonomi

Græsukrudt bliver dyrere at håndtere gennem sæsonen

Græsukrudt: Områder med store mængder græsukrudt bør sammenlignes med pletter, der er udvintret - og som kræver omsåning.

Jacob Krog, specialkonsulent, Virksomhedsøkonomi, Seges.

Det ideelle tidspunkt til at starte indsatsen mod græsukrudt er i planlægningsfasen, så der ikke bliver sået vintersæd på arealer, der er hårdt ramt af græsukrudt. For det øger risikoen for yderligere opformering af frøpuljen.

Virkeligheden kan dog af og til være mere dynamisk, end den er planlagt til. Derfor kan det være nødvendigt at gribe ind i løbet af sæsonen. Figuren viser tabet ved at lave en indsats på fire udvalgte tidspunkter. Den tidligste indsats (1) er i det tidlige forår, hvor hveden endnu ikke er blevet gødet. Indsats nr. 2 er i første del af april, hvor det stadig er muligt at sprøjte med glyphosat og etablere en vårsæd rettidigt.

Beregn tabet

Beregningen er baseret på afgrødens økonomiske værdi på et givent tidspunkt. Værdien er beregnet som forventet brutto-udbytte fratrukket omkostninger, der endnu ikke er afholdt. Tabet i 1 og 2 begrænses med DB2 fra den vårbygmark, der etableres i stedet.

Hvis der først tages hånd om problemet i slutningen af maj, er omsåning ikke længere en reel mulighed. Men da græsukrudtet endnu ikke har sat frø, kan man nøjes med en brakpudsning af de angrebne områder. I slutningen af juni – efter frøsætning – er det også nødvendigt at bortskaffe materialet.

Her er bortskaffelsen indregnet som skårlægning, presning, wrapning og salg til biogas. Tørstofudbyttet på dette tidspunkt er begrænset og blot indregnet med en værdi svarende til omkostningerne til at bjærge materialet. Det kan variere ret meget med arealets omfang, men denne løsning er den absolut dyreste, da alle omkostninger til hveden på nær høst er afholdt, og udbyttet er begrænset.

Udbyttetab

En helt central forudsætning for beregningen er det forventede udbytte på arealet med græsukrudt. De blå søjler er med 60 procent af normudbytte som repræsentant for hårdt ramte områder. De grønne er med 90 procent af normudbyttet til at vise tabet på arealer, der er let påvirket af græsukrudt.

Der er ikke en sikker vej til at estimere det nøjagtige udbytte

tetab fra græsukrudt i det tidlige forår. Derfor er denne beregning ikke en præcis anvisning af tabet - men en meget tydelig indikation af, at tabet ved at så om er meget lavt i det tidlige forår på områder, der er hårdt ramt.

Og hvis man har pletter, der er hårdt ramt, som først identificeres, når det ikke længere er muligt at så om, så er et tab på 6-7.000 kroner per hektar for disse områder stadig til at overskue - i sammenligning med den enorme frøpulje, der kan opformeres hvis der ikke gøres noget.

Marker, der er blevet hårdt ramt af græsukrudt, kan kræve sædskiftemæssige handlingsplaner i seks-otte år med vårsæd som primært virkemiddel. Det gælder både på kort og lang sigt, at omkostningen ved at vente kan være markant højere - sammenlignet med det umiddelbare tab her og nu. Derfor bør områder med store mængder græsukrudt håndteres på samme vis som pletter, der er udvintret. Her er der ingen tvivl om, at omsåning i det tidlige forår er den rette løsning.

SEGES, Erhvervsøkonomi laver også:

- Økonomiske beregninger og vurderinger
- Regnskabsanalyser og benchmarking
- Afgrødekalkuler




Anbefalinger

- 1 Tilpas afgrødevalg, så græsukrudt ikke opformeres
- 2 Håndter områder, der er hårdt angrebet, tidligt i sæsonen

Forudsætninger

- Vinterhvede efter korn.
- JB 5-6.
- Hvedepris: 150 kr. pr. hkg.
- Bygpris: 140 kr. pr. hkg.
- Husdyrgødning: 100 kg N pr. ha.
- Kvælstofpris: 8 kr. pr. kg N.

Tab på forskellige tidspunkter ved omsåning eller destruktion pga. græsukrudt



Beregnet tab ved omsåning af vinterhvede efter korn (1 og 2) eller destruktion uden (3) eller med bortskaffning af materiale (4).