

Godkendelse af Pictor Active udvidet til hvede og byg

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet [Pictor Active](#) (boscalid+pyraclostrobin) netop har fået udvidet sin godkendelse til brug i hvede og byg. Pictor Active må anvendes som enkelt eller delt behandling med 2 x 0,5 l/ha og maks. 2 behandlinger pr. sæson med min. 14 dages interval. Der må anvendes maks. 1,0 l pr. sæson og ikke senere end vækststadie 69. I Landsforsøgene 2022 side 82 ses effekten mod de enkelte svampesygdomme. Der er kun svag effekt mod meldug.

I forvejen er Pictor Active godkendt i raps, ligesom midlet har flere mindre anvendelser i bl.a. frøgræs og hestebønner. Firmaet anbefaler tilsætning af Agropol til Pictor Active i alle afgrøder.

Pictor Active indeholder boscalid, som er et såkaldt SDHI-middel. Midlet Entargo indeholder også boscalid. Normaldoseringen på 1,0 l Pictor Active indeholder foruden boscalid fuld dosering Comet Pro, dvs. 1,25 l Comet Pro.

For at forsinke resistensudvikling hos Septoria i hvede og bygbladplet i byg mod SDHI-midler anbefales det kun at anvende SDHI-holdige midler én gang pr. sæson. Foruden Pictor Active og Entargo indeholder Propulse et SDHI-middel (fluopyram).

Pictor Active har været afprøvet i landsforsøg i hvede og byg. I hvede har midlet været sammenlignet med andre løsninger i vækststadie 32 og klaret sig på samme niveau. Da Propulseholdige løsninger anbefales i vækststadie 55-61, ønskes Pictor Active ikke anvendt i vækststadie 32 i hvede. I vårbyg har Pictor Active også klaret sig på niveau med andre løsninger i vækststadie 31-32. I vækststadie 39-45 har blandingen 0,35 l Propulse + 0,2 l Comet Pro/Orius Gold (50 procent dosis) klaret sig lige så godt som 0,3 l Pictor Active + 0,2 l Propulse (50 procent dosis) i vårbyg, så på dette tidspunkt anbefales begge løsninger. I vinterbyg har de to løsninger også klaret sig lige godt på det sene tidspunkt.

[Læs mere om reglerne for anvendelse af Pictor Active i Middeldatabasen.](#)

7. februar 2023