

Planter

Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet

Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en måde, der forebygger udvikling af herbicidresistens.

Viden om Opdateret Kl. 08:31

Sædskeer med stor andel af vintersæd, tidlig såning og øget udbredelse af pløjefri dyrkning betyder, at græsukrudt som agerrævehale, italiensk rajgræs og væselhale mange steder er blevet et problem. Endvidere bliver der i flere og flere bestande af italiensk rajgræs og agerrævehale konstateret herbicidresistens og senest er der fundet resistens i bestande af vores mest udbredte græsukrudsart enårig rapgræs.

Det har omkostninger at forebygge græsukrudt og udvikling af resistens, men alternativet er væsentligt større omkostninger på længere sigte, når det er gået galt, f.eks. med en stor opformering af italiensk rajgræs, agerrævehale eller væselhale. Og ikke mindst, hvis der samtidig er udviklet resistens.



Billede 1. Væselhale, som især ved pløjefri dyrkning har et stort potentiale for at blive opformeret, bekæmpes effektivt med vårafgrøder i sædskiftet. Ved fremspiring om foråret sætter væselhale ingen frø. Foto: Poul Henning Petersen, SEGES Innovation.



Billede 2. Italiensk rajgræs i forager af vinterhvede. Planterne har ALS-resistens, dvs. Cossack OD og Broadway kan ikke længere bekæmpe bestanden. Foto: Poul Henning Petersen, SEGES Innovation.



Billede 3. I marken på billede 2 findes planter af italiensk rajgræs med forskellig følsomhed over for Cossack OD, som er anvendt tidligt forår. Tv. følsom plante, der er bekæmpet og th. plante der ikke er påvirket af 0,9 l/ha Cossack OD. Foto: Poul Henning Petersen, SEGES Innovation.



Billede 4. Billede fra forsøg med tidlig og sen såning samt forskellige kemiske bekæmpelsesstrategier efterår og forår. Forrest ses en blok med sen såning den 25. september 2020 og i baggrunden en blok med tidlig såning den 3. september. I forsøget er der en meget stor effekt af såtid, og ingen kemiske løsninger har været tilfredsstillende ved tidlig såning. Der er mistanke om en vis grad af resistens i rajgræsbestanden i denne mark. Foto: Poul Henning Petersen, SEGES Innovation.



Billede 5. Billedet viser parcellerne fra forsøget vist på billede 4, hvor der ikke er udført kemisk ukrudtsbekæmpelse. Forskellen skyldes alene såtid og falsk såbed. Hele forsøget er rotorharvet 3. september og blokkene er rotorharvesået hhv. 3. september og 25. september. Foto: Poul Henning Petersen, SEGES Innovation.



Billede 6. Forsøget i billede 4 set fra drone. Dronebilledet viser tydeligt blokkene med tidlig og sen såning. Foto: Morten Steg, LandboSyd.

Forebyg opformering af ukrudt

Et afbalanceret sædskifte giver de bedste muligheder for at forhindre, at nogle ukrudtsarter bliver til et problem, og det er den bedste sikring mod udvikling af herbicidresistens. Derudover er der en lang række tiltag, som vil bidrage til at mindske ukrudtsbestanden:

- **Vårsæd mindsker frøsætning i de fleste græsser.** Væselhale og almindelig rajgræs kan spire frem i vårsæd, men kan ikke sætte frø uden en vinter med kuldepåvirkning. Italiensk rajgræs og agerrævehale har væsentlig mindre fremspiring om foråret, men kan sætte frø uden kuldepåvirkning. Derfor er vårsæd ikke en hurtig løsning mod agerrævehale og italiensk rajgræs, hvis bestandene er blevet store. Enårig rapgræs sætter frø hele året og trives bedst under fugtige forhold. Med kortere vækstsæson og ofte tørre forhold under etableringen giver vårsæd derfor mere modspil til enårig rapgræs end vintersæd. Vindaks spirer normalt slet ikke frem om foråret.
- **Udsættelse af såtidspunktet for vintersæd** giver mindre fremspiring af ukrudt, og er ikke mindst effektivt ved store græsukrudtsproblemer. Som tommelfingerregel bliver fremspiringen halveret ved at udsætte såtidspunktet med 2 uger. Tidlig såning frarådes derfor, hvor agerrævehale, rajgræs og væselhale er et problem, samt hvor der generelt er meget græsukrudt. Samtidig virker jordmidlerne bedre ved sen såning, hvor jorden typisk er mere fugtig og jordtemperaturen lav, så de ikke nedbrydes så hurtigt.
- **Vinterrug, vinterbyg og triticales har i nævnte rækkefølge større konkurrenceevne mod ukrudt end hvede.** Det gælder under forudsætning af samme såtid. Ved tidlig såning af hybrider af rug og vinterbyg med lav udsædsmængde bliver konkurrencefordelen derfor mere eller mindre ophævet i forhold til en normal såtid for alle arter, men hybridvinterbyg har ved tidlig såning størst konkurrenceevne.
- **God etablering** med jævn fordeling af planterne betyder, at afgrøden har god konkurrenceevne mod ukrudtet. Såteknik med lille rækkeafstand er i den forbindelse en fordel.
- **Udsædsmængden justeres i forhold til såtidspunkt.** Øget plantetal giver bedre konkurrence mod ukrudt. På arealer med vanskelige arter som agerrævehale, italiensk rajgræs og væselhale bør udsædsmængden øges. Efterhånden som der er udstyr til

graduering af udsædsmængde til rådighed, kan der opnås en fordel mod græsukrudt ved at øge plantetallet i områder med meget græsukrudt.

- **Urørt stub i så lang tid som muligt** efter høst giver størst "dødelighed" for både frø af græsukrudt og de fleste andre ukrudtsfrø. En undtagelse er gold hejre, hvor en overlig stubbearbejdning (maks. 3 cm) lige efter høst får frøene til at spire. De fleste græsser har begrænset spirehvile, så når frøene ligger på jorden, vil de spire første gang, der kommer en fugtig periode. Frø, der ligger på jorden, vil ud over spiring også i stort omfang blive ødelagt ved svampeangreb eller spist af fugle og insekter. Er der behov for at fordele halm og avner eller bekæmpe snegle, bør det ske med redskaber, der arbejder overfladisk i øverste 2 cm, f.eks. halmstrigler eller harvetyper med præcis dybdestyring.
- **Etabler efterafgrøder uden jordbearbejdning ved meget græsukrudt.** Efterafgrøder kan dog kræve en let harvning for at få størst succes, men det anbefales at foretage så overlig en harvning som muligt, så ukrudtsfrøene ikke bringes ned, hvor de går i spirehvile.
- **Afslåning eller nedvisning før frøsætning** af enkeltplanter eller mindre pletter med græsser, som er slæbt ind med halmpresser eller mejetærsker, så spredning forebygges.
- **Beskyt markkanter mod ukrudtsmidler**, så der opstår en stabil græskant, som ikke giver plads til burresnerre, blød og gold hejre, væselhale m.fl.
- **Slå om muligt markkanten**, hvis der vokser uønskede ukrudtsarter, f.eks. gråbynke (hvis det er tilladt), men slå så sent som muligt inden frøspild af hensyn til blomster, som er fødegrundlag for bier og insekter.
- **Sprøjt forageren til sidst**, så 'filmen' af jordmiddel ikke brydes, når der vendes med sprøjten.
- **Øg doseringen af ukrudtsmidler i forageren**, hvor afgrøden ofte er mere åben, og dermed ikke yder ukrudtet så god konkurrence.
- **Skift bredde på forageren** når du pløjer, så sammenpløjningen, hvor ukrudtsplanter og spildfrø bliver pløjet ned og op igen, ikke bliver placeret samme sted år efter år. F.eks. ses italiensk rajgræs ofte i bånd, der følger sammenpløjningen. Sprøjt evt. sammenpløjninger og i markhjørner med glyphosat før pløjning eller før såbedstilberedning, hvis der er spiret græsukrudt frem eller der er tuer, som har overlevet jordbearbejdning. Undgå ved GPS-sektionsaflukning, at der opstår kiler ved forageren, når bommen ved drejning svinger rundt og lukker for tidligt i den side, som står stille eller svinger baglæns. Løsningen kan være at køre frem til hele ageren er sprøjtet, og derefter bakke tilbage og dreje rundt.
- **Høst ½-1 meter fra markkanten**, hvor der er græsukrudt.
- **Rengør mejetærsker og halmpresser** så godt som muligt, så spredning mellem marker og ejendomme begrænses.
- **Lad spildfrø af frøgræs ligge urørt i stubben** så længe som muligt og etablér en vårafgrøde efter frøgræs.
- **Anvend kun rensed udsæd.**
- **Gå efter en nul-tolerance** for italiensk rajgræs og agerrævehale.
- **Kend dit frøkast.** Udnyt dit kendskab til, hvor meget frø ukrudtet kaster og foretag enten målrettet pløjning ved stort frøkast eller overgå til pløjefri overlig harvninger eller CA dyrkning ved lavt/ingen frøkast. CA eller minimal jordbearbejdning giver mindre forstyrrelse af jorden og dermed mindre fremspiring fra frøpuljen, men det skal kombineres med, at frøkastet har været lavt. Husk, at der, uanset om der pløjes eller ej inden jordbearbejdning, skal være god tid til henfald i stub.

Se også oversigter over IPM-tiltag:

Italiensk rajgræs

Agerrævehale

Væselhale



Billede 7. I parcellen er etableret 250 hvedeplanter pr. m². Efter den kemiske bekæmpelse er der en del agerrævehaletoppe, som kommer igennem.



Billede 8. Denne parcel har fået samme behandling som parcellen i billede 1. Men der er etableret 500 hvedeplanter pr. m². Her er der meget få agerrævehale, som kommer op i afgrøden.

Frøpuljemanagement

Hvis bestanden af italiensk rajgræs, agerrævehale, væselhale eller andre græsser er på vej til at komme ud af kontrol, bør der iværksættes en målrettet indsats for at rette op, som vil afhænge af om der pløjes, eller der er pløjefri dyrkning.

Løsning ved reduceret jordbearbejdning

Ved pløjefri dyrkning vil næsten alle frø ligge i det øverste jordlag. Efterlad efter høst de nye ukrudtsfrø i stubben og lad stubmarken ligge urørt længst muligt, så flest mulige af frøene går til. Pløj arealet efter en omhyggelig indstilling af ploven, så jordlaget med græsukrudsfrø placeres ensartet i bunden af plovfuren. Sørg for at nedvisne græsukrudt, som ikke er pløjet ned, samt nyfremspiret græsukrudt med glyphosat før tilberedning af såbed om foråret. Dyrk vårsæd mindst 1-2 år.

Genoptag efter denne ene gang pløjning den pløjefri dyrkning med en større andel af vårafgrøder i sædskiftet og senere såning af vintersæd. En meget stor andel af græsukrudsfrøene vil dø i løbet af 3-4 år, når de er lagt ned i 20-30 centimeters dybde. Skulle det igen blive nødvendigt, kan der igen efter 4-5 år pløjes og vendes jord op, som stort set vil være tømt for frø af græsser.

Hvis den pløjefri dyrkning er praktiseret med dybdeharvning i et væsentligt omfang, vil ovennævnte strategi være mindre effektiv, da en del frø vil være bragt ned i en vis dybde. Det vil tilnærmelsesvis svare til pløjning.

Løsning når jordbearbejdning er baseret på pløjning

Ved pløjning vil der være ukrudtsfrø i hele pløjelaget. Efterlad efter høst de nye ukrudtsfrø i stubben og lad stubmarken ligge urørt længst muligt – gerne helt frem til december eller foråret, så flest mulige frø går til inden pløjning. Ved etablering af vårsæd nedvisnes overlevende og nyfremspiret græsukrudt med glyphosat i pløjejorden inden tilberedning af såbed i foråret. Flere år med vårafgrøde nedbringer efterhånden frøpuljen.

En stor del af græsukrudsfrøene mister i løbet af 3-4 år spireevnen, når de ligger nede i jorden. Men en lille del af frøene vil være levedygtige i op til 8-10 år. Hvor mange år der bør dyrkes vårsæd afhænger af, hvor store bestande af græs, der har været og hvor meget

det er lykkedes at begrænse frøsætningen i vårafgrøderne. Sen såning og gerne falsk såbed er afgørende tiltag, hvis vintersæd igen skal være muligt på arealerne.

Hvis der med en vårafgrøde, f.eks. hestebønner, opnås et år uden frøkast, kan det overvejes at undlade pløjning og etablere de efterfølgende vårafgrøder enten via CA-system eller meget øverlig harvning, således at den dybere liggende frøpulje ikke aktiveres ved jordbearbejdning. Hvis det nogle år lykkes at dyrke vårsæd uden frøkast af græsserne, vil frøpuljen nede i jorden være stærkt reduceret og pløjning vil igen være mulig.

Herbicidresistens

Herbicidresistens hos agerrævehale og ital. rajgræs er nu så udbredt, at der er udsigt til store økonomiske tab, hvis du ikke gør en aktiv indsats for få nedbragt og i sidste ende elimineret etablerede bestande af de to arter. For alle gælder det om at undgå, at der bliver slæbt nye bestande ind på arealer, hvor agerrævehale eller ital. rajgræs ikke findes, idet der er betydelig risiko for, at det kan være frø fra resistente planter. Betragt resistent rajgræs og agerrævehale som flyvehavre, dvs. gå også efter enkeltplanter med glyphosat i rygsprøjten eller lugning.

Der er især stor risiko for udvikling af resistens hos agerrævehale, ital. rajgræs, fuglegræs, kamille og valmue over for ALS-hæmmere (kaldet SU- eller minimidler). Men nu ses også ALS-resistente bestande af enårig rapgræs. ALS-midler er relativt billige, mens en række andre midler med en anden virkemekanisme, der kan modvirke udvikling af resistens, er væsentligt dyrere. Det er vigtigt at 'investere' i resistensforebyggelse ved at anvende effektive doseringer af de dyrere midler. I vintersæd imødegår du bedst udvikling af resistens ved at begrænse anvendelse af ALS-hæmmere (SU-midler) om efteråret og få bestanden af græsukrudt bragt ned, så behov for bekæmpelse om foråret bliver minimeret.

Ved den såkaldte target-site resistens, hvor ukrudtsplanterne er resistente over for en specifik virkemekanisme, eksempelvis ALS-hæmmere, er bekæmpelse mulig med en anden virkemekanisme. Target-site resistens er det normale hos tokimbladet ukrudt. Græsserne udvikler derimod hurtigt såkaldt metabolisk resistens, hvilket betyder, at ukrudtsplanterne har nedsat følsomhed over for flere eller alle typer af ukrudtsmidler. Ved metabolisk resistens er der kun dyrkningsmæssige tiltag, som virker, dog suppleret med den effekt, der stadig kan opnås med de kemiske midler Boxer, Stomp, DFF og Mateno Duo, som stadig har effekt.

Risikoen for resistens er størst ved store bestande af ukrudt af den simple grund, at der så er flere planter pr. ha, som har de gener, som gør planten mindre følsom overfor ukrudtsmidlerne.

Brug forskellige virkemekanismer

Skift mellem midler og strategierne, hvor der ikke er problemer med resistens.

Den afgørende faktor for udvikling af resistens hos agerrævehale, er hyppigheden af sprøjtning. I en stor engelsk undersøgelse, var det den eneste faktor, som med statistisk sikkerhed kunne påvises at drive udviklingen af resistens. Men teorien om resistensudvikling tilsiger dog stadig at bruge forskellige virkemekanismer.

Er det nødvendigt at bruge Atlantis OD mod rajgræs om efteråret, bør eventuel forårsopfølgning ske med Topik. En anden mulighed som anbefales, er at anvende Topik eller Adimax om efteråret og Hussar Plus OD, Cossack eller Broadway om foråret.

Mange bestande af agerrævehale har nedsat følsomhed over for flere af ukrudtsmidlerne. Derfor er senere såning og Boxer/Mateno Duo i høj dosis nødvendig. To uger senere kan Topik og/eller Adimax anvendes mod den del af bestanden, som ikke måtte være resistent. Vent med ALS-hæmmerne Atlantis OD eller Broadway i fuld dosis til om foråret. Normalt vil Atlantis (mesosulfuron) være det middel, som ved begyndende udvikling af metabolisk resistens bevarer effekten i længst tid.

Er der mistanke om ALS-resistens hos fuglegræs eller kamille på arealer, hvor der gennem mange år hyppigt er anvendt SU-midler, bør der vælges en strategi, hvor de bekæmpes så effektivt som muligt med midler med andre virkemekanismer. Ikke mindst er det vigtigt med en høj effekt af jordmidlerne om efteråret.

Planlæg indsatsen mod græsukrudt

Oversigten angiver forskellige "bestande" af græsukrudt og giver forslag til strategi for den kemiske bekæmpelse.

Tabel 1. Forslag til strategi mod forskellige bestande af græsukrudt.

Ukrudtsbestand og dyrkningsforhold	Strategi for kemisk ukrudtsbekæmpelse
Pløjning indgår normalt som led i jordbearbejdningen	
Enårig rapgræs i et varieret sædskifte	Boxer eller Mateno Duo anvendt i efteråret bør være det primære valg. Jo mere vårsæd i sædskiftet jo lavere dosis er mulig, men juster altid dosis i forhold til bestanden af enårig rapgræs i den aktuelle mark. DFF i høj dosis har også væsentlig effekt. Supplerende bekæmpelse om foråret med Atlantis vil normalt ikke være aktuelt. I alsidige frøgræssædskifter kan der anvendes relativt høje doser af Boxer for at nedbringe bestanden af enårig rapgræs mest muligt.
Enårig rapgræs og evt. lidt vindaks i et varieret sædskifte	Boxer sikrer kontrol med små bestande af vindaks. DFF i høj dosis har også væsentlig effekt mod enårig rapgræs. Mateno Duo har også effekt, men bedst i blanding med Boxer. Opfølgning om foråret mod græsukrudt er normalt ikke nødvendig.
Vindaks og enårig rapgræs i større bestande	Afhængigt af bestanden af vindaks anvendes Boxer om efteråret i en dosering fra 0,75 liter til 1,5 liter pr. ha. Mateno Duo i dosering på 0,7 liter pr. ha i vinterhvede eller i blanding med Boxer (0,4 l Mateno Duo +0,5-1 l Boxer pr ha) vil også have effekt. Om foråret bekæmpes overlevende vindaks efter behov. Både Atlantis OD, Broadway, Rexade, Serrate, Cossack OD og Hussar Plus har effekt, så eventuel forekomst af andre græsser vil bestemme middelvalget.
Almindelig rapgræs, enårig rapgræs, vindaks	Boxer, som bør anvendes mod enårig rapgræs og vindaks, har god effekt på alm. rapgræs, der spirer fra de øvre jordlag, men ikke på planter, der spirer fra dybere lag. På arealer med almindelig rapgræs er det derfor nødvendigt at supplere bekæmpelsen om foråret med f.eks. 80-90 g Broadway, 23-26 g Rexade 440, 0,1-0,15 l Topik, 0,4-0,5 l Cossack OD eller 0,35-0,4 l Atlantis OD pr. ha. Middelvalg er afhængigt af forekomsten af andre græsser. Sprøjt i det tidlige forår, mens planterne er små.

Ukrudtsbestand og dyrkningsforhold	Strategi for kemisk ukrudtsbekæmpelse
Almindelig rajgræs og enårig rapgræs	1,5-2 liter Boxer eller 0,75-1 l Boxer + 0,35 l Mateno Duo pr. ha "lægger låg" på almindelig rajgræs om efteråret, således at bekæmpelsen kan gøres færdig med Cossack OD, Broadway, Serrate eller Hussar Plus om foråret. Hvis der om foråret både er behov for at bekæmpe enårig rapgræs og rajgræs, anbefales Cossack OD eller Broadway + Atlantis. Også Broadway/Rexade har en vis effekt på enårig rapgræs.
Italiensk rajgræs og/eller meget stor bestand af almindelig rajgræs	Ved italiensk rajgræs eller meget store bestande af rajgræs kan det være aktuelt at bekæmpe rajgræs med Atlantis OD i efteråret. Atlantis bør om efteråret altid blandes eller kombineres med Boxer. Effekt af Atlantis kræver gode vækstbetingelser. Det er med hensyn til udvikling af herbicidresistens ikke bæredygtigt, hvis der anvendes ALS-hæmmer to gange pr. vækstsæson, så det er afgørende med dyrkningsmæssige tiltag, hvor dyrkning af vårafgrøder og senere såning af vintersæd vil give størst effekt. En mulighed er at anvende Topik til opfølgning om foråret. En anden mulighed er at anvende Topik eller Adimax om efteråret og Hussar Plus, Cossack eller Broadway om foråret. I vinterbyg er den eneste mulighed at øge dosis af Boxer til mindst 2-3 l pr. ha om efteråret og følge tidligt op med den begrænsede dosis Hussar Plus, der er mulig om foråret. Det hurtigt stigende antal tilfælde af herbicidresistens hos italiensk rajgræs understreger, at det er bydende nødvendigt at tage alle både kemiske og ikke kemiske midler i brug for at få nedbragt og på længere sigt elimineret bestanden. I landsforsøg 2019 er bekæmpelse af resistent italiensk rajgræs belyst. Her skal der doseringer på mellem 2,5-5 liter pr. ha Boxer til for at få god effekt, men der ses stadig meget italiensk rajgræs til foråret.
Agerrævehale og enårig rapgræs	Sædskifte med vårafgrøder og sen såning er de vigtigste dyrkningsmæssige tiltag mod agerrævehale. Et skifte mellem midler gennem sædskiftet forebygger også resistensudvikling hos agerrævehale, dvs. eksempelvis Agil/Focus Ultra i bredbladede afgrøder, MaisTer i majs og Kerb i vinterraps. Hvor der gennem en årrække er anvendt fop/dim-midler og ALS-hæmmere er der med stor sandsynlighed nedsat effekt og bedste chance for at opnå fuld effekt er ved at anvende høj dosis af Boxer + DFFeller Boxer + Mateno Duo tidligt efterfulgt af Topik/Primera Super i stadie 12-13. Om foråret følges op med Atlantis eller Broadway.
Væselhale	Væselhale er meget vanskelig at bekæmpe kemisk, så det må stærkt anbefales at dyrke en vårafgrøde i mindst to år efter en betydende invasion af væselhale i vintersæd. Bekæmpelse kan lade sig gøre med passende høje doser af Boxer eller Mateno Duo + Boxer i vinterhvide under græssets fremspiring og en efterfølgende sprøjtning med

Ukrudtsbestand og dyrkningsforhold	Strategi for kemisk ukrudtsbekæmpelse
	omkring 0,6 l Atlantis OD pr. ha ca. 2 uger senere. Rettidighed er helt afgørende. Om foråret er effektiv bekæmpelse ikke muligt, om end Broadway, Cossack OD og Atlantis hæmmer væksten.
Gold og blød hejre	På pløjede arealer optræder gold hejre og blød hejre normalt kun langs hegn og i foragre, idet frøene ikke kan overleve et helt år i bunden af pløjelaget. Overfladisk stubbearbejdning lige efter høst har god effekt mod gold hejre, men ikke mod blød hejre. Omhyggelig pløjning og sen såning giver en væsentlig bekæmpelse. Findes der meget hejre i kanten af marken, kan det overvejes at etablere vårbyg i det yderste sprøjtespor eller så yderste omgang så sent som muligt. Hejre vil normalt ikke optræde i vårsæd, såfremt man sikrer, at der ikke er overlevende planter ved såning.
Pløjefri dyrkning - glyphosat anvendes altid før såning eller sekundært umiddelbart efter	
Enårig rapgræs i et varieret sædskifte - pløjefrit	Selv med et 'varieret' sædskifte med høj andel vårafgrøder kan enårig rapgræs blive et problem, hvis der ikke er fokus at opnå en effektiv bekæmpelse af græsser hvert år. Jordmidlerne Boxer, Mateno Duo og DFF har en nedsat effekt, hvor der er meget plantemateriale på jordoverfladen. Hvis der er mange stub- og halmrester på jordoverfladen kan det være aktuelt at gennemføre sprøjtningen med lidt højere dosis, når græsukrudtet er fremspiret med 1-2 blade. På dette sprøjtetidspunkt opnås både blad- og jordvirkning. Tidligt forår vurderes behov for at følge op med Atlantis eller Cossack OD mod enårig rapgræs. Hold øje med gold og blød hejre, så eventuel plet- eller randbehandling med Broadway kan gennemføres.
Agerrævehale, italiensk rajgræs, almindelig rajgræs, væselhale, vindaks, gold og blød hejre i vintersædsbaseret sædskifte - pløjefrit	I et vintersædsbaseret sædskifte er det vigtigt at inddrage alle IPM-tiltag for at styre græsukrudtet, så de nævnte græsukrudsarter aldrig får lov at blive et problem. Undgå så vidt muligt tidlig såning, idet fremspiring af græsukrudt fremmes meget ved tidlig såning. Såarbejdet bør gennemføres ekstra omhyggeligt, så afgrøden bliver etableret bedst muligt og dermed yder græsset konkurrence. Gold hejre er spirevillig i stubben, såfremt der harves meget overligt (3 cm) umiddelbart efter høst. Hejrearterne skal bekæmpes med Broadway i foråret, så snart de observeres i marken. Tjek allerede markerne i det tidlige forår, så planterne ikke bliver for store før bekæmpelse. Udnyt Kerb i vinterraps til at sanere græsukrudt og forsinke udvikling af

Ukrudtsbestand og dyrkningsforhold	Strategi for kemisk ukrudtsbekæmpelse
	herbicidresistens.

CA - Conservation Agriculture

Græsser og tokimbladet ukrudt	I CA er der en anderledes dynamik i frøpuljen. Ukrudtsfrøene bliver efter høst liggende oven på jorden, hvor størstedelen går til i løbet af efteråret. Og ved såning bliver kun få frø nede i jorden provokeret til at spire. Modsat vej tæller, at ukrudtsfrøene fra årets frøkast forbliver på jordoverfladen, så der hurtigt kan ske en opformering, hvis bekæmpelsen mislykkes. Generelt er det samme strategi for bekæmpelse der kan anvendes, som ved pløjefri dyrkning. Men der er mulighed for et stadigt faldende bekæmpelsesbehov, når dyrkningen lykkes og frøpuljen i jordoverfladen gradvist udtømmes.
-------------------------------	--

Læs også:

Ukrudtsbekæmpelse I vintersæd i efteråret – valg af midler

Italiensk rajgræs skal bekæmpes med IPM

Overraskende udvikling af herbicidresistens hos enårig rapgræs

IPM-inspirationsark:

Væselhale spreder sig eksplosivt

Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning

Bekæmp ukrudt med sædskiftet

Bekæmp væselhale i frøsædskiftet

Blød hejre i frøgræs

Forebyg resistens mod ukrudtsmidler

Italiensk rajgræs som ukrudt

Begræns spredningen af ukrudt

Emneord

Græsukrudt og tokimbladet ukrudt

Integreret plantebeskyttelse - IPM

Triticale

+4

Publiceret: 04. oktober 2019

Opdateret: 02. juli 2024

Vil du vide mere?



Carsten Fabricius

Afdelingsleder

SEGES Innovation P/S

cars@seges.dk

+45 2924 5175



Poul Henning Petersen

Landskonsulent

SEGES Innovation P/S

php@seges.dk

+45 2010 2297



Jens Erik Jensen

Landskonsulent

SEGES Innovation P/S

jnj@seges.dk

+45 2171 7706

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES Innovation P/S	Tlf.	8740 5000
Agro Food Park 15	Fax.	8740 5010
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk