



Udfasningen af medicinsk zink giver ikke kun udfordringer, men også nye muligheder

Af Tina Sørensen, senior-konsulent, Seges Innovation

Tidligere har foderskift fra blanding et til to været begrundet i lovgivningen angående brug af medicinsk zink i 14 dage. Når medicinsk zink er ude af foderet, kan skiftet fra blanding et til to foregå på det mest hensigtsmæssige tidspunkt. Der kan i højere grad tages højde for grisenes størrelse og udfordringer med diarré. Forskellige fodringsstrategier undersøges i øjeblikket på forsøgsstation Grønhøj og vil efterfølgende blive afprøvet i en produktionsbesætning.

En anden mulighed er brug af særlige 'skåneblandinger' i kortere kritiske perioder. Mange besætninger oplever udfordringer med diarré på stort set samme tidspunkt i hvert ugehold. Årsagen kan ikke altid tilskrives tilstedeværelsen af sygdomsfremkaldende bakterier som E.coli. Det er derfor blevet undersøgt, om brug af en særlig skånsom blanding i meget kort tid kan reducere forekomsten af diarrébehandlin-

ger uden at påvirke tilvæksten. I det nyeste forsøg blev grisene tildelt en foderblanding med meget lavt proteinindhold, organiske syrer og råvarer med høj fordøjelighed i 6 dage fra dag 3 til 9 efter fravænning. Behandlingsdage mod diarré blev reduceret med 30 procent, uden at tilvæksten blev påvirket. I efteråret 2022 opstartes endnu et forsøg, hvor et skånefoder skal anvendes i meget kort tid. Skånefoderet vil blandt andet have en grovere formaling, da det også har vist en reducerende effekt på forekomsten af diarré, når det anvendes i hele perioden fra 7-30 kg.



Fakta

- Der er potentiale i at anvende særligt skånsomt foder i meget kort tid for at reducere diarré. Som et af de få tiltag kan det gøres uden at påvirke tilvæksten negativt. Foderet kan sammensættes med udgangspunkt i elementer, som har vist gode resultater i forsøg fra 7-30 kg.