

SoLiv 2.0

Soen længe Leve



Monitorizarea zilnică a unității de gestație

Obiectivul pentru monitorizarea zilnică a unității de gestație este garantarea unei detectări rapide și a unui tratament corespunzător pentru scroafele bolnave. Șchiopătarea sau problemele la copite sunt unele dintre cele mai frecvente motive pentru tratamentul medical, mutarea într-un coteț pentru îngrijirea medicală și/sau sacrificarea în unitatea de gestație.

Pentru a garanta un rezultat optim al monitorizării zilnice, detectarea scroafelor bolnave trebuie să fie cât mai timpurie. În continuare, sunt enumerate instrucțiuni practice pentru monitorizarea zilnică a unității.

Acorduri și strategii în vigoare

Trebuie să se convină asupra unei strategii clare pentru șeptel, în ceea ce privește monitorizarea și tratarea scroafelor bolnave. La această sarcină preliminară trebuie să participe

veterinarul șeptelului și toți angajații care lucrează în unitatea de gestație.

Monitorizarea și tratarea scroafelor trebuie coordonate cu alte sarcini care se desfășoară în unitate. În multe dintre cazuri, detectarea scroafelor bolnave are loc la hrănire și la curățarea cotețului. Aceste scroafe trebuie însemnate cu spray și notate pentru a facilita mutarea și evaluarea lor ulterioară.

Apoi, efectuați un control de sănătate mai amănunțit, în special pentru a examina scroafele. Cu alte cuvinte, nu asociați această monitorizare cu curățarea culcușurilor. O puteți asocia, însă, cu împrăștierea așternutului din paie. Este recomandat ca doi angajați, dintre care unul cu experiență, să efectueze acest control.

Semne clinice: ce aspecte trebuie să aveți în vedere

Efectuați zilnic următoarele activități:

- Treceți prin toate cotețele și verificați zilnic starea fiecărei scroafe.
- Evaluarea scroafelor trebuie să aibă loc atunci când acestea se deplasează, pentru detectarea timpurie a scroafelor șchioape.
- Acordați atenție, în special:
 - scroafelor care stau culcate în afara culcușurilor
 - scroafelor care stau culcate departe de celelalte animale
 - purcelelor și scroafelor tinere
 - scroafelor aduse recent în unitate
- Apoi, stimulați scroafele (de exemplu, prin împrăștierea paielor).
- Verificați dacă scroafa se ridică ușor. Dacă scroafa scâncește atunci când se ridică, acest lucru indică o boală și/sau o leziune.
- Examinați cu atenție scroafa. Dacă scroafa este apatică și neinteresată, nu mănâncă, s-a îndepărtat de celelalte animale sau șchioapătă, trebuie să interveniți.



Acordați atenție următoarelor simptome de șchiopătare

1. Prezintă regiuni umflate în jurul copitei?
2. Prezintă umflături articulare?
3. Scroafa se deplasează normal?
4. Cât de gravă este șchiopătarea?
5. Stimularea scroafei a ameliorat sau a înrăutățit oricare dintre aceste simptome?

Când trebuie intervenit? Cum trebuie procedat?

Este important să se intervină cât mai repede în cazurile de șchiopătare.

Tratamentul medicamentos administrat scroafei trebuie convenit cu veterinarul șeptelului. De asemenea, la fiecare vizită, veterinarul trebuie să intre în cotețele în care sunt grupate scroafele și să efectueze controale în cotețele pentru îngrijire medicală.

Multora dintre scroafele care șchioapătă li se poate administra un tratament împotriva durerii. Utilizarea antibioticelor este necesară/relevantă doar în cazurile confirmate de infecție.

Situația în care o scroafă refuză să se ridice sau nu se poate sprijini pe un picior indică o fractură. Scroafa trebuie examinată mai atent și trebuie luată în considerare sacrificarea sa.

Combaterea infecției în copită sau în jurul acesteia este dificilă, din cauza cantității reduse de sânge în aceste regiuni. Prin urmare, prevenirea și intervenția promptă sunt esențiale.



Când trebuie transferată scroafa în cotețul pentru îngrijiri medicale?

În cazul în care se detectează o scroafă bolnavă în unitatea de gestație, care nu mănâncă, nu își găsește locul în așternutul de paie sau prezintă alte simptome asemănătoare, aceasta trebuie transferată în cotețul pentru îngrijiri medicale.

Cotețele pentru îngrijiri medicale destinate scroafelor trebuie să aibă un culcuș moale, amplasat pe o podea cu scurgere, cu suficient așternut din paie.

Fiecare scroafă din cotețul pentru îngrijiri medicale trebuie să aibă o fișă medicală unde vor fi notate tratamentul și posibilele îmbunătățiri ale stării de sănătate. Conveniți cu veterinarul șeptelului criteriile care trebuie îndeplinite pentru retratare și sacrificare.

