

SoLiv 2.0

Soen længe Leve



Щоденний контроль стійла супоросних тварин

Мета щоденного контролю в період вагітності — якомога раніше виявити хворих свиней і забезпечити їхнє належне лікування. Кульгавість або проблеми з копитами — найпоширеніші причини медичного втручання, перевезення до лікарняного боксу й/або відділення в стійлі супоросних тварин.

Щоб забезпечити найліпший результат щоденного контролю, потрібно якнайшвидше виявити хворих свиней. Нижче наведено практичні інструкції для щоденного контролю стійла супоросних тварин.

Чинні домовленості й стратегії

Для стада має бути застосовано чітку й узгоджену стратегію щодо контролю й лікування хворих свиней. Для виконання цього завдання має бути залучено

ветеринара стада й усіх працівників стійла супоросних тварин.

Контроль і лікування свиней треба координувати з іншими завданнями в стійлі. У багатьох випадках хворих свиней буде помітно під час їхнього годування й очищення загону. Цих свиней треба промаркувати розпилювачем і занести в журнал контролю, щоб полегшити їхнє переміщення і повторну оцінку.

Згодом зробить ретельніше спланований обхід, головна мета якого — перевірка стану здоров'я свиней. Інакше кажучи, цей контроль не можна поєднувати з очищенням місць, де лежать свині, проте його можливо поєднати з розкиданням соломи для підстилки. Доречним буде виконати інспекційний обхід, долучивши двох працівників, один з яких уже матиме досвід. ➤

Клінічні ознаки: що шукати

Дотримуйтеся наведених далі щоденних заходів. Кожного дня робіть обхід усіх загонів, перевіряючи кожну свиню.

Щоб виявити кульгавих тварин на ранній стадії захворювання, оцінювати свиней треба, коли вони рухаються.

Зверніть особливу увагу на таких тварин:

- свині, котрі лежать за межами місць для лежання;
- свині, котрі лежать окремо від інших;
- підсвинки й молоді свині;
- свині, нещодавно розміщені в стійлі.

Потім активізуйте свиней (наприклад, розкидавши солому).

Перевірте, чи легко свині підводиться. Якщо свиня верещить, коли встає, це може вказувати на захворювання і/або травмування.

Ретельно обстежте тварину. Якщо свиня виглядає млявою та байдужою, не їсть, відокремлюється від інших або кульгава, з вашого боку потрібні відповідні дії.



Перевірте наявність симптомів кульгавості

Чи є навколо копит набряклі ділянки?

Чи є набряклі суглоби?

Чи нормально ходить свиня?

Наскільки серйозна кульгавість?

Як активізація свині впливає на будь-які з симптомів: поліпшує чи погіршує їх?

Коли треба реагувати?

Що треба робити?

Виявивши кульгаву тварину, дуже важливо реагувати якнайшвидше.

Надання медичної допомоги свиням має бути погоджене з ветеринаром стада. Так само під час кожного візиту ветеринара він повинен заходити в загои, де згруповані свині, і робити обходи лікарняних боксів.

Багатьох свиней, які стали кульгавими, можна заспокоїти знеболювальними препаратами. Використовувати антибіотики потрібно / доречно лише у випадках явного зараження.

Якщо свиня відмовляється встати або не може триматися на одній нозі, це може вказувати на перелом. Таку свиню треба ретельніше обстежити й у разі потреби відділити.

Боротися з інфекцією в копитах і навколо них важко через низьке кровопостачання в цих ділянках. Ось чому такими важливими є попередження і вчасне втручання.



Коли треба перемістити свиню в лікарняний бокс?

Якщо в стійлі супоросних тварин буде виявлено хвору свиню, яка не приймає їжу або не може знайти собі місця на соломяній підстилці чи має подібні симптоми, її потрібно перемістити в лікарняний бокс.

У лікарняних боксах для свиней на сухій підлозі має бути влаштовано м'які підстилки з достатньою кількістю соломи для лежання.

Для кожної свині в лікарняному боксі треба вести медичну картку із записами всіх лікувальних заходів і можливого поліпшення стану здоров'я тварини. Критерії для повторного лікування й відділення хворої тварини мають бути узгоджені з ветеринаром стада.

