

# To-, tre- eller fire-fasefodring af smågrise

**Af Af Hanne Maribo, chefforsker**

Det er ikke længere nødvendigt at skifte foder 14 dage efter fravænning. Smågrise kan fodres med samme blanding i de første fire uger efter fravænning, da normerne er de samme.

Færre smågriseblandinger giver færre gradvise foderskift med mulighed for brug af billigere råvarer og for at tage hensyn til produktivitet, foderbetning og økonomi. Det blev undersøgt i en afprøvning med smågrise, hvor fem fodringsstrategier med variation i antallet af blandinger og råvarer blev testet.

Antallet af blandinger påvirkede ikke produktivitet og diarrébehandlinger. Derfor kan du med fordel anvende færre blandinger til smågrisene også med billigere råvarer.

En superblanding med blodplasma, valle og sojaproteinkoncentrat i to uger gav øget foderoptagelse, men ingen forskel i diarrébehandlinger, og effekten blev udlignet målt fra fravænning til 30 kg.

Den billige foderblanding med sojaskrå og kartoffelpro-

teinkoncentrat viste færrest diarrébehandlinger og højest produktionsværdi mod en dyrere blanding suppleret med fiskemel, sojaproteinkoncentrat og vallepulver.

Glidende foderskift over to uger gav samme produktivitet og diarrébehandlinger som kontrol med tre faser. Uanset antallet af blandinger og billige eller dyre råvarer, er der ikke negativ effekt på produktivitet og diarrébehandlinger. Afprøvningen blev gennemført på Grønhøj – de bedste strategier skal i 2023 testes i en besætning.



## Ny forskning

- Kun i halvdelen af tilfældene skyldes smågrisediarré en af de bakterier, der blev testet for.
- I de resterende tilfælde kan diarréen skyldes foderskift eller foderets råvarer.
- Læs mere i Meddelelse nr. 1266.



**Foderblanding** med blodplasma, valle og sojaproteinkoncentrat gav ikke højere tilvækst end mere enkelt sammensatte blandinger.