

## Spørgsmål til fx Kahoot vedr. BROK

1. Hvad er normal forekomst af brok ved fravænning:
  - a. 2 %
  - b. 4 %
  - c. 6 %
  - d. 8%

Svaret er 4 %
2. En hurtig udtørring af navlestrengen minimerer risikoen for brok. Hvor lang tid tager det normalt:
  - a. 0-4 timer
  - b. 4-8 timer
  - c. 8-12 timer

Svaret er 4-8 timer
3. En lang navlestreng kan sidde fast i stien og give øget risiko for brok, men hvornår skal den klippes af?
  - a. Når grisen lige er født
  - b. Når alle grise i hele kullet er født
  - c. Når navlestrengen er tørret ind

Svaret er når navlestrengen er tørret ind
4. Er brok arveligt?
  - a. Ja
  - b. Nej

Svaret er ja
5. Kan brok avles væk?
  - a. Ja, det kan gøres hurtigt
  - b. Nej
  - c. Ja, men det tager mange år

Svaret er ja men det tager mange år
6. Antibiotikabehandling kan forebygge brok?
  - a. Ja
  - b. Nej
  - c. Delvist

Svaret er delvist
7. Buler under maven er altid brok?
  - a. Ja
  - b. Nej

Svaret er nej, der er også bylder, cyster og andet
8. Har grisen brok i farestalden skal den aflives?
  - a. Ja

- b. Nej
- c. Måske

Svaret er måske, brok kan forsvinde indtil ca. 15 ugers alderen

9. Brok er kun et problem pga. transportegnethed?

- a. Ja
- b. Nej

Svaret er nej

10. Brok er et problem i forhold til dyrevelfærd

- a. Ja
- b. Nej

Svaret er ja

11. Brok gør ondt på grisen?

- a. Ja
- b. Nej

Svaret er ja, det tror vi

12. Der er forskel på forekomst af brok i forskellige avlssystemer?

- a. Ja
- b. Nej
- c. Det ved vi ikke

Svaret er det ved vi ikke

13. For at få færre grise med brok skal man:

- a. Behandle de grise, der har brok
- b. Slå de grise, der har brok ihjel
- c. Forebygge brok med forskellige managementtiltag

Svaret er at forebygge brok med forskellige managementtiltag

14. Det at forebygge brok giver kun ekstra arbejde

- a. Ja, derfor er det nemmere at aflive de grise, der har brok
- b. Nej, mange af de ting der forebygger brok øger også produktiviteten

Svaret er nej, mange af de ting der forebygger brok øger også produktiviteten

15. Hvilken dyregrupper har størst forekomst af brok?

- a. Sogrise
- b. Galtgrise
- c. Hangrise

Svaret er sogrise

16. Har fødselsvægten indflydelse på forekomsten af brok?

- a. Ja
- b. Nej
- c. Det ved vi ikke

Svaret er nej

17. Grise, der flyttes væk fra deres egen mor, har mindre frekvens af brok, end de grise, der fravænnenes ved egen mor?

- a. Ja
- b. Nej
- c. Der er ingen forskel

Svaret er nej, de får mere

18. Har stiens hygiejne ved faring betydning for forekomsten af brok?

- a. Ja
- b. Nej
- c. Det ved vi ikke

Svaret er er ja, dårlig hygiejne giver infektion af navlen og dermed infektion og øget risiko for navlebrok

## Питання для Kahoot щодо ГРИЖ

1. Яка нормальна частота виникнення грижі при відлученні поросят від свиноматки:

- а. 2%
- б. 4%
- в. 6%
- г. 8%

Відповідь 4%

2. Швидке висихання пуповини мінімізує ризик виникнення грижі. Скільки часу зазвичай займає цей процес:

- а. 0-4 години
- б) 4-8 годин
- с) 8-12 годин

Відповідь 4-8 годин

3. Довга пуповина може застрягти поміж інвентарем і збільшити ризик грижі, але коли її слід перерізати?

- а. Коли порося щойно народилося
- б. Коли народжуються всі поросята в усьому посліді
- в. Коли пуповина висохла

Відповідь - коли пуповина засохла

4. Чи є грижі спадковими?

- а. Так
- б Ні

Відповідь - так

5. Чи можна вивести утворення гриж генетично?

- а. Так, це можна зробити швидко
- б Ні

в. Так, але це займає багато років

Відповідь - так, але це займає багато років

6. Лікування антибіотиками може запобігти виникненню грижі?

- а. Так
- б Ні
- в. Частково

Відповідь часткова

7. Випинання, припухлості та новоутворення під животом - це завжди грижі?

- а. Так
- б Ні

Відповідь - ні, є також фурункули, кісти та інше

8. Якщо у поросят є грижа в відділі опоросу, чи потрібно їх завжди вбивати?

- а. Так

б Ні

в. Можливо

Можливо, відповідь полягає в тому, що грижі можуть зникнути приблизно в 15-тижневому віці

9. Грижа - це проблема тільки через транспортабельність?

а. Так

б Ні

Відповідь - ні

10. Грижа є проблемою щодо добробуту тварин

а. Так

б Ні

Відповідь - так

11. Чи болять грижа у поросят?

а. Так

б Ні

Відповідь: так, ми так думаємо

12. Чи є різниця в частоті гриж в різних порід свиней?

а. Так

б Ні

в. Ми не знаємо

Відповідь така: ми не знаємо

13. Щоб мати менше поросят з грижами, необхідно:

а. Лікуйте поросят, у яких є грижа

б) Вбивати поросят, які мають грижу

с. Профілактика гриж за допомогою різних заходів лікування

Відповідь полягає в запобіганні грижі за допомогою різних заходів лікування

14. Профілактика гриж дає лише додаткову роботу

А. Так, тому легше забити поросят, у яких є грижа

б) Ні, багато речей, які запобігають грижі, також підвищують продуктивність

Відповідь - ні, багато речей, які запобігають грижі, також підвищують продуктивність

15. Які групи тварин мають найбільшу захворюваність грижами?

а. Підсисні поросята

б. Кабани-кастровані самці свиней

в. Кнури — некастровані кабани

Відповідь - Підсисні поросята

16. Чи впливає вага при народженні на виникнення гриж?

а. Так

б Ні

в. Ми не знаємо

Відповідь - ні

17. Поросята, яких відлучили від додаткової/ іншої матері, мають меншу частоту грижі, ніж поросята, яких відлучили від власної матері?

а. Так

б Ні

в. Немає різниці

Відповідь - ні, вони отримують більше

18. Чи впливає гігієна заgonу під час опоросу на виникнення грижі?

а. Так

б Ні

в. Ми не знаємо

Відповідь: так, погана гігієна призводить до інфікування пупка, а отже, інфекції та підвищення ризику пупкової грижі

1. What is normal occurrence of hernia at weaning?
  - a. 2%
  - b. 4 %
  - c. 6 %
  - d. 8%Answer: 4%
  
2. A fast drying out of the umbilical cord minimizes the risk of hernia. How long does it usually take?
  - a. 0-4 hours
  - b. 4-8 hours
  - c. 8-12 hoursAnswer: 4-8 hours
  
3. A long umbilical cord can get stuck in the inventory and increase the risk of hernia, but when should it be cut off?
  - a. Right after birth
  - b. When all piglets are born
  - c. When the umbilical cord is dryAnswer: When the umbilical cord is dry
  
4. Is hernia hereditary?
  - a. Yes
  - b. NoAnswer: Yes
  
5. Is it possible to breed hernia away?
  - a. Yes, it can be done easy
  - b. No
  - c. Yes, but it takes several yearsAnswer: Yes, but it takes several years
  
6. Antibiotica treatment can prevent hernia?
  - a. Yes
  - b. No
  - c. PartiallyAnswer: Partially
  
7. Bumps under the abdomen are always hernia?
  - a. Yes
  - b. NoAnswer: No, it can also be abscesses, cysts and other
  
8. If the piglet in the farrowing section has a hernia, it should be killed?
  - a. Yes
  - b. No
  - c. MaybeAnswer: Maybe, hernia can disappear until they are about 15 weeks old

9. Hernia is only a problem because of transportability?

- a. No
- b. Yes

Answer: No

10. Hernia is a problem according to animal welfare?

- a. Yes
- b. No

Answer: Yes

11. Does hernia hurt the pig?

- a. Yes
- b. No

Answer: Yes, we believe that

12. Is there a difference in the incidence of hernias in different breeding systems?

- a. Yes
- b. No
- c. We don't know

Answer: We don't know

13. To get less pigs with hernia you should

- a. Treat the piglets with hernia
- b. Kill the piglets with hernia
- c. Prevent hernia with different management actions

Answer: Prevent hernia with different management actions

14. The jobs to prevent hernia only give extra jobs?

- a. Yes, that's why it is easier to kill the piglets with hernia
- b. No, a lot of the management actions also increase the productivity
- c. Answer: No, a lot of the management actions also increase the productivity

15. Which group of animals has the highest incidence of hernia?

- a. Females
- b. Males
- c. Castrated pigs

Answer: Females

16. Does the birth weight affect the risk of hernia?

- a. Yes
- b. No
- c. We don't know

Answer: No

17. Piglets which are moved from their mother have a lower risk of hernia compared to the piglets that are weaned by their own mother?



- a. Yes
- b. No
- c. There is no difference

Answer: No, they have higher frequencies of hernia

18. Does the hygiene in the pen around farrowing affect the incidence of hernia?

- a. Yes
- b. No
- c. We don't know

Answer: Yes, bad hygiene increases the risk of infection in the umbilical cord and infection in general and then also increase the risk of hernia.