

Ens farehold sikrer succes

Kan man sikre en lavere pattegrisedødelighed og lettere pasning i farestalden, ved at sikre ens ugehold ved indsættelse i farestalden? Ja er det korte svar.

Spørgsmålet opstod hos en ung svineproducent, der lige havde overtaget ejendommen og havde fokus på, hvor der evt var flaskehalse i produktionsanlægget.

Året efter overtagelsen kunne han konstatere, at stigende kuldstørrelse og lidt flere søer i anlægget gav markant stigende pattegrisedødelighed og store udfordringer i planlægningen af farestaldsarbejdet. Nogle uger var der kun få ammesøer, og i andre uger var næsten hver anden so en ammesø. Til stor frustration for medarbejderne og ikke mindst en erkendelse af, at ikke alle søer pr. automatik fungerer som ammesøer. Historisk var oplevelsen, at antal søer til faring svingede mellem 30 og 55, selvom målet var 38 faringer pr. uge. Pattegrisedødeligheden var over 15%, og en optælling viste, at 60% af ugerne lå udenfor intervallet +/- 2 faringer fra det ønskede!

Beslutningen blev at indkøbe løbeklare sopolte, anvende polteopdrætsstalden til ekstra smågrise og systematisere løbninger/drægtighedskontrol.

Efter ændringerne er pattegrisedødeligheden nu faldet til 11-12%, kuldstørrelsen er steget med over 3 grise/kuld og der fravænnedes nu +150 grise hver uge. Antal ammesøer blev umiddelbart reduceret, men på grund af den markante stigning i levendefødte er andelen nu igen på samme niveau.

Med baggrund i bl.a. dette eksempel har vi i den lokale rådgivning om grise udviklet et Flow-/flaskehalsprogram til at synliggøre, hvor i besætningen udfordringerne ligger. Ud fra 14 grafiske billeder kan vi illustrere, hvor i besætningen flaskehalsene er og vise, hvad der skal til for at optimere produktionsflowet.

Bjarke Lassesen

