

Nr.	Afsnit	Tiltag	k = Krav eller a = Anbefaling
1	Tjek før start	Belægning skal følge lovgivningen -	k
3	Tjek før start	Der skal laves vejehold med måling på minimum dag 0 og 14, gerne også på dag 28. Skal helst være minibrovægt eller gennemløbsvægte.	k
4	Tjek før start	Mulighed for at besøge og optimere driften af soholdet.	a
5	Tjek før start	Hvilken genetik bruges som mødre og fædre til smågrisene? Ved hjemmeavl skal bruges avlsindekser og kernestyring.	a
6	Tjek før start	Anvendelse af TopDuroc sæd	a
8	Tjek før start	Fravænningsvægten baseret på faktiske vejninger - minibrovægt eller vægt på stikprøver af grise.	a
11	Tjek før start	Hold øje med prod. gris pr. m ² . Tallet skal ligge mellem 400 og 600 kg pr. m ² pr. år. Opgøres pr. sektion. Er ca. 150 kg pr. stiplads af 0,30 m ² .	a
13	Tjek før start	Under opstart laves en diagnostisk analyse af besætningen, således at der minimum er redegjort for sygdommene E.Coli, PRRS, PCV2 og Lawsonia. Diagnostik kan være udført ved eksempelvis reb-, blod- eller sokkeprøver for enkelt sygdomme	a
14	Klargøring	Ved positive svar for E. Coli, Lawsonia og B. Pilosicoli mv. bør der foreligge en plan for antibiotisk behandling og evt. vaccination	a
15	Klargøring	Besætningsdyrlægen vurderer sammen med personalet effekten af antibiotikabehandlingerne samt udseende af gødning ved opstart og afslutning af behandling. Ved manglende eller varierende effekt bør resistensundersøgelse inddrages	k
16	Klargøring	Til hver sektion skal redskaber og fodtøj i kontakt med grisene være rengjort. Medicinkasse rengøres og kanyler udskiftes før opstart.	k

17	Klargøring	Antal ædepladser max. 50 grise pr. automat hjemmeblandet foder, og 60 grise ved færdigfoder i hele smågriseperioden. Min. 22 cm krybbeplads pr. gris ved ædelystfodring (våd/tør).	k
18	Klargøring	Lys tændt fra kl. 7 til 22.	a
19	Klargøring	Vandydelse tjekkes. Ventiler skal yde 0,5-0,8 liter pr. minut. for høj ydelse giver overtryk og evt. fugtig foder. Drikke-kopper skal yde 1,0 liter pr. minut. Drikkekop max. 20 grise pr. stk. Ventiler max. 10 pr. stk. Hav eventuelt et ekstra sæt vandventiler til afkalkning, så defekte ventiler kan udskiftes.	k
20	Klargøring	Drikkeventiler er placeret i en højde, hvor de fravænnede grise kan nå dem. Vandret bideventil 20 cm. Drikkekop 10-15 cm til drikkekant.	k
21	Klargøring	Der skal bruges sæbe og desinfektionsvæske i forbindelse med vask. Alle løsdele rengøres OGSÅ legetøjspinde.	k
22	Klargøring	Overdækning af lejerne skal være med nedadbukket forkant, og maksimalt 70 cm åbning. Overdækningen skal være på 0,08 m ² /gris.	k
23	Klargøring	Optimerede stier til de mindste grise er med halmbæret, gardin eller hundehulsplade. Stier må ikke placeres ved yder-væg, under skorsten og/eller under temperatursensor.	k
24	Klargøring	Undgå betonspaltegulv i gødearealet, det øger gødningskontakten og risiko for diarre	a
25	Klargøring	Udtørring af stalden opstartes. Sæt ønsket rumtemperatur til 30 grader. Der må ikke udtørres kun med gulvvarme, der skal suppleres med rumvarme og/eller varmekanon	k
26	Klargøring	Eventuel varmekanon stilles til ønsket temperatur på 2 grader lavere end ønsket rumtemperatur på ventilationscomputer.	k
27	Klargøring	Under udtørring stilles ventilation til 5-15% af maksimum ventilation. Er samme som 2-6 m ³ /dyr/time	k
28	Klargøring	Udtørring tjekkes med IR termometer på beton under overdækning. Skal være 32 grader. Skriv i logbogen. Tjek om der er duggede ruder, eller vand ned af glasset.	k

29	Klargøring	Vandrør renses med oxyderende stof eller pereddikesyre imens at stalden er tom. Tilsæt frugtfarve for at sikre at hele rørsystemet er fyldt. Systemet skal stå i tomgang i 5 timer. Rensning af vandrør kan også udføres ved store grise før afgang. Produkt skal være godkendt til grise	k
30	Klargøring	Lige før grisene indsættes skal der sikres frisk vand i alle rør og ventiler. Hver ventil aktiveres til der kommer koldt vand. Brug eventuelt tøjklamme.	k
31	Klargøring	Tjek ventilation ved min. og max. ventilation. Gøres ved at hæve eller sænke ønsket rumtemperatur. Kig på spjæld og luftventiler. Loftventiler kontrolleres for sprækker, der må ikke være støvfaner eller spindelvæv der bevæger sig.	k
32	Klargøring	I klimacomputer tjek temperaturkurve for smågrisene, tjek at uret står korrekt.	k
33	Klargøring	I klimacomputer tjek minimumsventilations kurven, skal starte på 2 m ³ /dyr (4%) og slutte på på 6 m ³ /dyr (13%). Tjek at rigtig antal dyr er indtastet.	a
34	Klargøring	Ved start møde tages IR fotos af: Vægge, lofter og yderdøre. Afslører mangelfuld isolering og/eller plastafdækning.	a
35	Klargøring	Overbrusning indstilles til at starte når udetemperatur er over 16 grader. Der må kun overbruses fra kl. 9 til 20	a
36	Klargøring	Hulerne skal strøes med halm, savsmuld eller andet fugtsugende materiale for at holde nyindsatte grise tørre	k
37	Indsættelse	Ved første døgn skal grisene have 31 grader under overdækningen, gulvet skal være 32 grader og ønsket rumtemperatur være indstillet til 25 grader. Gulvvarme skal vise ca. 40 grader frem og ca. 35 grader retur. Gælder ved 5,5 kg. Kan være forskellig. Kig også på hvor grisene ligger sig.	k
38	Indsættelse	Grise med forskellig alder holdes fra hinanden, så de ved indsættelse og afgang ikke drives igennem andre sektioner med grise.	a
39	Indsættelse	Sortering af grise ved ankomst. De mindste sorteres til 1-2 stier. Der holdes 2 stier tomme, og indsættes lidt ekstra grise i hver af de andre sti. Efter 7-21 dage fyldes de tomme stier eventuelt i 2 hak.	a
41	Farestald	Grise i farestald skal fodres 2 gange dagligt fra 10. dag, og 4 gange dagligt fra 18. dag. Forventes målsætning: Grise på 25 dage skal have optaget 500 gram foder/gris	k
42	Farestald	Grise lokkes til æde før fravæning vha opblødt foder - 1:1	a

43	Farestald	Antal fravænnede grise (faringer) varierer med max 10 %	a
44	Farestald	Hvis der er mælkeanlæg i farestald, skal der også suppleres med tørfoder ved at lukke for mælkeanlægget i de sidste dage inden fravænning	k
45	Farestald	Vaccination af avlsdyr skal så vidt muligt dække de kendte lidelser i besætningen. Der skal være taget stilling til lidelser, som der ses symptomer på hos grise i vækst.	k
46	Farestald	Baby-, buffer- og containerstalde må ikke drives kontinuerligt. Sektionen skal tømmes helt hver gang.	a
1			
52	Farestald	Farestierne skal rengøres og desinficeres før hvert hold grise. Der skal udtørres ordentligt. Desinfektionsmiddel skal indeholde Glutaraldehyd eller være oxiderende. Såfremt der er påvises coccidier skal desinfektionen også være virksomt overfor disse. Glutaraldehyd må <u>ikke</u> bruges i stalde med dyr	a
53	Farestald	Grise som er små, men trivelige, ved fravænning flyttes til optimerede smågrisestier. De flyttes aldrig til en ny so.	a
54	Farestald	Diegivningstid på E-kontrol må ikke være under 27,0 dage	a
55	Farestald	Grise som fravænnnes før fravænningsdagen (ammesøer) skal holdes for sig. De må ikke være alene i farestier.	a
56	Farestald	Hvis hele sektioner af farestier kan benyttes, kan søerne flyttes dagen før grisene flyttes til smågrisestalden. Krav til øget staldtemperatur og strategi til sikring af tilstrækkeligt foder og vand til grisene.	a
57	Farestald	Anvend jerninjektion for at være sikker på dosis.	a
60	Daglig pasning	Der må ikke flyttes grise imellem sektionerne. Kun fra en babystald til "normal" fravænningsstald.	a
61	Daglig pasning	Sygesti. Grise som er raske flyttes IKKE tilbage til den oprindelige sti.	k
62	Daglig pasning	Den daglige sygerunde skal gå fra yngste til ældste gris. Hvis der er en separat sygesektion, skal den tilses sidst. Grisene bliver i sektionen	k
63	Daglig pasning	Rengør og desinficer fodtøj efter indgang i stier med diarré. Alternativt gøres et støvleskift mellem sektionerne, brug af overtrækssko i stier med diarre. Skift af handsker, eller desinficer hænder, mellem sektioner.	a

64	Daglig pasning	Der laves grundigere gennemgang af alle grise dagligt . Alle grise skal op og gå.	k
65	Daglig pasning	Der skal dagligt kontrolleres for diarré i alle stier. Grise med diarré skal findes, mærkes og behandles efter besætningsdyrlægens anvisning. Ved 2 klatter diarre pr. 35 grise bør AB flokbehandling igangsættes.	k
66	Daglig pasning	Der skal dagligt kontrolleres for luftvejsinfektioner i alle stier. Grise der puster skal findes, mærkes og behandles efter besætningsdyrlægens anvisning. Ved udtalt hoste og lungebetændelse hos mere end 10% bør AB flokbehandling igangsættes. Obs noter effekten af alle behandlinger "er symptomerne borte"	k
67	Daglig pasning	Ved udbrud af diarré tildel vand med elektrolytter i et trug eller indsæt et eller flere trug med ekstra vand (et trug pr. 30 grise).	a
68	Daglig pasning	Aktiver grisene 4-6 gange dagligt vha enten foder eller væske de første minimum 5 dage. Foder: minimum 4-6 gange dagligt i langtrug, krybbe eller på gulv . Væske kan være i oplødt foder eller tynd elektrolyt vand. Sigt efter 100 ml væske pr. dag pr. gris	k
69	Daglig pasning	Tilsætning af syrer til drikkevandet som minimum i de første 14 dage. OBS på indholdet af syre i startfoderet	a
70	Daglig pasning	E-vitamin tilsat drikkevandet, tilsætning af E-vitamin i drikkevand tilgodeser kun grise, der ikke æder og kræver også tilsætning af syre aht hygiejenen. Indholdet af E-vit i startfodert er langt over anbefalinger	a
71	Daglig pasning	Kig på grisenes liggeadfærd. Klumper de sammen er der for koldt. Ligger de på risterne er der for varmt, max. 4 grise på risterne i en hel sektion. Kig gerne på grisene udenfor normal arbejdstid evt. via kamera	a
72	Daglig pasning	Sygestier skal være indrettet med blødt underlag og varmelampe i overdækning. Lovgivning skal overholdes.	k
74	Daglig pasning	Der skiftes kanyler ved hver sektion. Der skiftes for minimum hver 10. gris.	a
75	Daglig pasning	Medicinering foretages bedst stivis, og alternativt sektionvis.	a

76	Daglig pasning	Bufferstald til grise som ikke er salgsklar bør ryddes og rengøres efter hvert hold, dog mindst 2 gange årligt.	a
77	Daglig pasning	Pejlemærker for grise som trives godt fra dag 0 til 14. Fravæningsvægt 6 kg: Tilvækst er 2,9 kg og foderoptagelsen er 4,55 FEsv. Fravæningsvægt 7 kg: Tilvækst er 3,1 kg og foderoptagelsen er 4,9 FEsv. Målepunkter ved 28 dage: Fravæningsvægt 6 kg Tilvækst er 9,3 kg og foderoptagelsen er 13,7 FEsv. Fravæningsvægt 7 kg: Tilvækst er 10,0 kg og foderoptagelsen er 16,2 FEsv	a
83	Foderlade	Strategi for fodring af små vs. store grise ved fravæning skal være fastlagt før opstart. Hvilken blanding skal små grise fodres med og hvor længe?	k
84	Foderlade	Letfordøjelige proteinråvarer i fravænningsblandingen: fiskemel (tilsættes hvis økonomisk optimalt), kartoffelprotein, vallepulver, mælk	k
85	Foderlade	5 % blodplasma i fravænningsblandingen til grise under 6kg - OBS specialproduktioner	a
86	Foderlade	min. 1 % syre i fravænningsfoderet, fx min. 0,5 % calciumformiat for at minimere foderkridt i blandingen og 0,5% benzoesyre	a
87	Foderlade		
89	Foderlade	Som minimum overholdes skånenormer i samtlige perioder jævnfør SEGES's nærrigstofnormer	a
90	Foderlade	I problembesætninger med fravænningsdiarré: Hjemmeblandet foder: Anvend groft formalet foder fra fravæning og 14 dage frem. Groft formalet foder = 50% under 1 mm (=anbefalingen til sofoder). Indkøbt foder: Køb groft formalet fx. expandat/eller melfoder. Den grove formaling i startfoderet øger foderforbruget med 0,15 FEsv/grise svarende til 75 øre/gris	a
92	Foderlade	Der skal bruges det samme foder i farestalden og i fravænningsstald.	a
93	Foderlade	Der er udarbejdet en strategi for foderskifte mellem blanding 1-2 og 2-3. Ved skift mellem blandinger skal skiftet foregå glidende over ca. 3 dage. Ved multifase gerne op til 5 dage. . Faseskiftet tilpasses grisene vægt og alder - anvend data fra vejehold. Skiftet til slutblanding skal ske så tidligt som muligt uden at det går ud over produktivitet	k
94	Foderlade	Kontroller at fordeling af foderfaserne stemmer overens med foderstrategien. Ved udarbejdelse ved E-kontrol kan dette fx udarbejdes	k
95	Foderlade	Minimum 3% laktose i fravænningsfoderet	a

96			
100	Foderlade	Løbende kontrol af sigteprofil. Skal laves ved opstart på alle blandinger og løbende hver 14. dag hos hjemmeblandere.	k
100	Medicinium	Ved AB behandling via drikkevand skal bruges vægt for at sikre korrekt dosering. Stamopløsningen må max være 24 timer. Følg dyrlægens anbefaling.	k
101	Medicinium	Kvartalsrapport og behandlingsplanerne fra dyrlægen gennemgås for at sikre at de følges.	k
102	Medicinium	Ring efter dyrlægen/rådgiver, hvis symptomerne er anderledes, end de plejer at være for den pågældende aldersklasse. Ring også, hvis der pludseligt er mange døde grise. Alternativt sættes et virtuelt møde op med rådgiver og dyrlæge	k
104	Medicinium	Korrekt dosering af injektionsmedicin - følg dyrlægens anvisning	k
105	Kontor	E-kontrol valideres med silokontrol på eks. sojaskrå og mineraler ved hjemmeblandere og købsstatistikker ved indkøbere af færdigfoder. Statusvægt på smågrisene skal ligeledes valideres og vurderes - brug samme metode hver gang.	k