

De vigtige klove

Magasinet Gris, oktober 23

Af Hanne Bak, dyrlæge
haba@seges.dk

Klovene danner i bogstavelig forstand grundlaget for et langt soliv, men studier viser, at op mod 80-99 procent af alle søer i en produktionsbesætning kan have forandringer som for eksempel lange eller uens klove, revner i klovens hvide linje, løsnede klovkapsler og/eller forhorning af ballen. Søer med dårlige klove kan have nedsat produktivitet, især fordi mælke-

ydelsen påvirkes, og klovskader kan give klovbylder, når bakterier fra stibunden trænger ind i kloven. Derfor er det vigtigt at forebygge klovskader, startende med korrekt udvælgelse, fodring og opstaldning af polte.

Gennem soens liv vedligeholdes klovsundheden ved at sørge for optimal fodring og tørt og rent miljø, og ved at minimere uro og slagsmål, som kan give klovskader, både i forbindelse med sammenblanding, men også

i resten af drægtigheden, så drægtighedsstaldens indretning skal tilgodese dette. Grundigt tilsyn kan hjælpe med at finde halte søer og søer med klovskader i tide, så en effektiv behandling kan iværksættes, og skadede klove kan i mange tilfælde rettes op med beskæring. Ved fravæning skal soen udsættes, hvis klovene ikke kan holde til endnu en drægtighed.

STØTTET AF

Svineafgiftsfonden