

Fra Magasinet Gris, maj 2023

Fælles retningslinjer for PRRS-sanering




Fakta

- Når PRRS-forekomsten skal reduceres, er det vigtigt at producenter og praktiserende dyrlæger arbejder sammen på et fælles grundlag for sanering for PRRS-virus.

Af Elisabeth Okholm Nielsen,
Hanne Bak, Bjørn Lorenzen og
Nicolai Weber.

Fælles retningslinjer til PRRS-sanering er afgørende for at sikre en god kommunikation imellem ejere og dyrlæger i et regionalt område, hvor der er et fælles ønske om at eliminere PRRS-virus. L&F har sammen med Seges udsendt en dansk anbefaling til overvågning, kontrol og sanering af PRRS i grisebesætninger. Sohouldets status inddeles i fire kategorier i forhold til cirkulation af virus. Anbefalingerne bygger på en kombination af internatio-



nal publiceret viden samt danske erfaringer.

Vejen til sanering for PRRS går over en fase, hvor soholdet er stabilt positivt, det vil sige, at der er immunitet i soholdet (antistof-positivt), men der er ikke længere er PRRS-virus i farestalden. Et positivt stabilt sohold kan producere fravænnede grise, som er fri for PRRS-virus. Blodprøver af de ældste grise i farestald el-

ler nyfravænnede grise skal testes i PCR-test hver måned i fire måneder som dokumentation.

Næste fase er antistof-test af de ældste smågrise. Disse smågrise må ikke have PRRS-antistoffer, det viser, at de ikke har været udsat for PRRS-smitte. Der testes hver måned i tre måneder.

Endelig skal der indsættes indkøbte PRRS-frie dyr, som

Sanering for PRRS i sohold, kategorier og overvågningsprøver eksemplificeret.

skal vise, om saneringen er lykkedes. Mindst 20 polte, der har været i soholdet i mindst fire uger, blodprøves. Når disse blodprøver er fri for antistoffer, kan besætningen skifte SPF-status til +sanPRRS. Dette gentages seks måneder senere. Når også det andet sæt prøver fra sentinel polte er fri for PRRS-antistoffer, er saneringen gennemført og soholdet kan få SPF status som PRRS-fri.

Den praktiserende dyrlæge er den primære rådgiver for, hvordan PRRS skal håndteres i det enkelte sohold. Anbefalingerne findes her https://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/lu_rapporter/manual_anbefaling_sanering_prs