


Smittestop i farestalden



Mål: Forebygge at PRRS hos et kuld pattegrise bliver spredt til flere kuld i sektionen
Forebygge at grise fra ældre ugehold smitter grise fra yngre ugehold med PRRS

Emne	Anbefaling	Kommentarer
Sektionering	Lav holddrift, så alle pattegrise i sektionen er født indenfor samme ugehold.	• Antallet af faringer skal passe med det antal farestier, der er i sektionen. • Sørg for plads til ammesøer i sektionen.
	Sektionen tømmes helt, og gulv, vægge, inventar og alt udstyr rengøres og desinficeres og udtørres.	• Hold skrabere, drivbrædder, behandlingskasse, drikkekrug og hundehulsplader i den enkelte sektion.
	Start dagen med rent tøj. Skift tøj, inden du går til en ny sektion, hvis tøjet er beskidt, eller der er spyt fra grisene på tøjet.	• Skift også tøj, hvis du går fra en sektion med ældre grise til en sektion med yngre grise.
	Alle grise i sektionen fravænnenes til smågrisestalden eller aflives. De må ikke få "en uge ekstra" hos en opsamlings so. INGEN TILBAGEFLYTNING!	• Smittede grise kan overføre smitte til det næste ugehold.
Kuldudjævning	De mindste grise kan samles hos en egnet mindsteamme.	• Fra 2 dage efter faring må mindsteammen ikke længere "fyldes op" med ekstra grise, hvis nogle af de første grise dør. • Ingen kuldudjævning efter 48 timer.
	De største overskydende grise i kuldet samles hos en ammeso. Ammesoen skal ind i ammegrisenes sektion, så alle grisene i sektionen har samme alder.	• Et lille kuld ved kuldudjævning kan fyldes op med grise, som alle er født af samme so.
	Når de mindste grise kommer til mindsteamme, og de største grise kommer til en ammeso, så skal kuldene ikke sorteres yderligere.	• Sortering efter størrelse giver mange flere flytninger, som spreder PRRS til flere kuld.
	Når en so bliver ammeso, så fravænner den sine grise ca. 3 dage inden resten af ugeholdet fravænnenes. Disse grise SKAL ud af farestalden, og flyttes til den smågrise-sektion, som fyldes op senere på ugen.	• Grise fra ammesøer må ikke blandes med grise fra andre farehold. De kan flyttes frem til det hold som blev fravænnet forrige uge, hvis grisene så også bliver flyttet til slagtegrisestalden med disse grise.
Pasning af grisene	Undgå så vidt muligt at gå ind i stien.	• Brug foder eller strøelse til at aktivere grisene ved tilsyn.
	En gris, som ikke trives efter kuldudjævning, kan have PRRS. Lad grisen blive i kuldet, så du ikke spreder smitte. Aftal med din dyrlæge, om I må bruge opsamlingssoer til grise, som ikke trives.	• En opsamlingsso håndteres ligesom en ammeso. Den skal flyttes til pattegrisenes sektion, og yveret tørres af. • Alle grise fravænnenes ved samme alder. • En gris som ikke trives ved fravænning skal aflives.
	Skift kanyle og skalpelblad mellem hvert kuld. Blod på en kanyle eller på et skalpelblad spreder let smitte.	• Skift også kanyle, hvis der kun var én gris i kuldet, som skulle behandles.
	Håndtér grisene i smågrisehjørnet i stedet for at samle dem i en vogn eller i baljer.	• Spytt og afføring i en vogn kan sprede PRRS-smitte til det næste kuld grise, der kommer op i vognen. I nogle tilfælde kan vognen vaskes mellem hver sektion.