


Smittestop i smågrisestalden



Mål: Undgå at ældre grise smitter de yngre grise med PRRS
Undgå at PRRS-smitte i en sti spredes til flere stier

Emne	Anbefaling	Kommentarer
Sektionering	Lav holddrift, så alle grise fra fareholdet flyttes ind i smågrisestalden.	Der skal være plads til alle fravænnede grise i sektionen.
	Der skal være rent fodtøj og rene redskaber til hver sektion.	Sørg for at skrabere, drivbrædder og behandlingskasse bliver i sektionen.
	Indsæt grisene kuldvis, så grise fra et smittet kuld ikke spredes til mange stier.	2-3 kuld grise kan samles i en sti med 30 grise.
	Tag rent tøj på, når du går ind i stalden. Start med tilsyn og behandling i sektionen med de yngste grise.	Undgå at flytte smitte fra ældre til yngre grise.
	Når der er flyttet grise på gangene, så skal gangene straks vaskes.	Undgå at drive slagtegrise, søer, gylte og polte igennem smågrisesektionerne.
	Ved udtagning til slagtegrisestalden skal alle smågise med. Hvis smitte med PRRS skal håndteres, så må variation i grisenes vægt accepteres. PRRS-smitten spredes, hvis der er grise, som ikke bliver udtaget af smågrisestalden, og som bliver sammenblandet med yngre grise.	Der bør ikke være opsamlingssektion til svage grise. Den vil fastholde PRRS-smitten i stalden. Alle grise i sektionen skal med i slagtegrisestalden. Ellers må grisene aflives.
Pasning af smågrisene	Undgå så vidt muligt at gå ind i stierne.	Ved tilsyn kan grisene aktiveres med halm eller foder på gulvet. Hvis du går ind i hver 3. sti, så kan du både se grisene i den sti du står i og i nabostierne.
	Skift kanyle mellem hver sti. Blod på en kanyle spreder smitte.	Skift også kanyle, selv om der kun er én gris i stien, som skal behandles.
	Syge grise bør samles i en sygesti, som er i sektionen.	Smågrise fra en sygesti må kun flyttes ud af sygestien igen, når sektionen tømmes.