


# Helikopterperspektiv



Sammenligning af den nye anbefalede foderkurve (■) med den tidligere anbefalede foderkurve (■) til polte fra 30 kilo til løbning.

## Ny foderkurve til polte

Målet med ny foderkurve er at sikre 13-15 millimeter rygspæk ved en poltealder på 30-33 uger.



### Af Thomas Bruun og Per Tybirk, Seges Innovation.

I forbindelse med, at Normudvalget har fastlagt nye normer for fordøjeligt protein og aminosyrer til polte, er der samtidig sket tilpasning af den anbefalede foderkurve til polte fra 30 kilo og frem til løbning.

Den gamle og nye anbefalede foderkurve ses af figuren herover med værdier indsat som støttepunkter og kan anvendes til for eksempel indtastning i vådfodercomputeren.

Tilpasningen er sket, fordi avlsfremgangen har medført en forbedret foderudnyttelse og højere kødprocent, og derfor skal der anvendes en højere foderstyrke end tidligere for virkelig at fremme aflejringen af rygspæk.

Foderkurven er baseret på, at poltene fasefodres i forhold til de anbefalede normer i Normer for Næringsstoffer, og tager udgangspunkt i tre foder-

blandinger, som præsenteres nærmere i efterfølgende artikel.

Bruges blandinger med højere indhold af protein længere end tilsigtet, bliver poltene tungere, men mere magre ved løbning.

Ved anvendelse af den nye foderkurve og fasefodring, forventes poltenes vægt at være 152 kilo, 158 kilo og 163 kilo ved henholdsvis 30, 31 og 32 uger. Hvis poltene først løbes ved en alder på 34 eller 35 uger, vil vægten være forøget til henholdsvis 174 og 180 kilo - en uønsket høj vægt ved løbning, som potentielt medfører, at flere polte udsættes, før de gennemfører 2. læg.

### Poltenormer

- Normudvalget har fastsat nye normer for fodring af polte.
- Målet er polte på 152, 158 og 163 kilo ved henholdsvis 30, 31 og 32 uger.