

Kunne dine slagtegrise vokse bedre?

**Af Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker
Seges Innovation, og Charlotte Mark Sa-
lomonsen, chefkonsulent, L&F Veterinært
Laboratorium, Kjellerup**

Raske grise vokser bedst. En ny tysk undersøgelse viser, at der er god sammenhæng mellem luftvejssygdom i slagtegrisestalden fire til otte uger før levering og forandringer i lungerne ved slagtning. Mycoplasma, andre bakterier og virus som PRRS og PCV2 kan hver for sig eller i fællesskab være årsag til lungebetændelse, og

det kan koste lavere tilvækst. En spansk undersøgelse viser, at det koster flere end otte foderdage ekstra for at nå samme slagtevægt, hvis mere end 10 procent af lungen er skadet.

Hvis du rekvirerer en USK-undersøgelse af lungerne ved slagtning, kan Veterinært Laboratorium i Kjellerup give svaret på antal grise med lungeforandringer, og hvor omfattende lungeforandringerne er i dine slagtegrise. Den praktiserende dyrlæge kan vurdere resultatet af lunge-USK-undersøgelsen og bidrage til en løsning. Kilder: Witt et al 2024 og Paz-Sánchez et al 2021