



Eksempel på løbesti med skridsikkert underlag og én æde-/insemineringsboks per so.

Undgå benproblemer i løbestien

Det er vigtigt at vurdere halthed hos søer før løbning. Selv let halthed øger risikoen signifikant for efterfølgende alvorligere halthed.

Af Lisbeth Ulrich Hansen, chefforsker, Seges Innovation

Søer med trippende gang eller let halthed blev observeret i en løbesti med æde/insemineringsboks og dybstrøelse i aktivitetsområdet. Afprøvningen viste, at der ikke var forskel i andelen af søer, der blev alvorligt halte i de undersøgte forsøgsgrupper.

Der var ikke forskel i andelen af søer, der blev halte, når der var 3 kvadratmeter/so sammenlignet med 5 kvadratmeter/so i løbestien. Det var heller ikke flere halte søer, når søerne var i boks i brunstperioden sammenlignet med dem, der ikke var i boks. Der var dog stor variation mellem de enkelte ugehold, og derfor anbefales det fortsat, at søer opboks i den egentlige brunstperiode, som den danske lovgivning giver mulighed for.

Det var overraskende, at der i løbet af afprøvningsperioden skete en udvikling i gennemsnitlig halthedsscore. I sommerperioden, hvor rumtemperaturen var højere, var der en udligning af forskellen i den gennemsnitlige halthedsscore mellem søer, der blev opstaldet i boks i brunstperioden, og søer, der ikke blev opstaldet i boks.

Søer, der lige er fravænet, har et stort behov for at kunne køle sig, og dette behov øges yderligere, når rumtemperaturen er høj. Løbestien i afprøvningen havde dybstrøelse i aktivitetsområdet, som ikke i samme grad som for eksempel betongulv i boksene kan tilgodese søernes behov for køling. Afprøvningen var desværre ikke designet til at afklare, om der var en sammenhæng mellem rumtemperatur, søernes brug af bok-

sene og udvikling af halthed.

I afprøvningen indgik kun søer med ingen eller kun let halthed (let trippende gang). Analyse af data viste dog, at søer med let trippende gang ved indsættelse i løbestien havde en signifikant større risiko for at blive alvorlig halte sammenlignet med søer, der ikke var halte ved ind-

sættelse. Den underliggende årsag til halthed blev ikke diagnosticeret, ligesom medicinsk behandling ikke indgik i afprøvningen.

Det anbefales derfor, at man vurderer halthed hos søerne før løbning, da selv let halthed øger risikoen signifikant for efterfølgende alvorligere halthed. Disse søer skal derfor ikke løbes, men bør slagtes.

Der blev ikke fundet sammenhæng mellem areal per so i stien eller brug af boks i brunstperioden på andelen af søer, der ikke blev løbet. Der var ikke sammenhæng mellem halthedsscore og om en so ikke blev løbet.

Undgå halte søer i løbestien

For at undgå, at søerne bliver halte i løbestien, bør:

- Søer opstaldes i boks i selve brunstperioden.
- Søer med trippende gang ikke løbes.
- Der være minimum 3 kvadratmeter/so i aktivitetsområdet.
- Der være et skridsikkert underlag, for eksempel dybstrøelse eller drænet, strøet halmmåtte.

■ Læs mere om afprøvningen her: Meddelelse nummer 1314 på www.landbrugsinfo.dk.