

Pas på søernes klove

Det er ikke altid nemt at se, hvad der gemmer sig under klovene på soen. Når soen står i drægtighedsstien er den ofte i bevægelse, og kloven kan være beskidt. Så snart søerne er opstaldet i farestien, er mulighederne helt anderledes, og det skal udnyttes

Af Lisbeth Ulrich Hansen, chefforsker, Seges Innovation

Når søerne flyttes ind i farestalden, er der en unik mulighed for at vurdere deres bevægelse. Søer, der går usikkert, skal mærkes op eller på anden måde noteres. Disse oplysninger skal indgå i den samlede vurdering af soen ved fravænning – skal den løbes eller slagtes?

Når søerne er indsat i farestien, er det nemt for personalet at gå søerne igennem og tilse deres klove. Langt de fleste klovforandringer og sår ses på søernes bagben, så det er dem, der skal fokuseres på. Hvis der ses forandringer på klovene eller sår ved kode eller biklov, skal der tages stilling til næste skridt.

Hvis soen har lange biklove, kan de trimmes i farestien med et 'mindre håndvåben' – for eksempel elektrisk håndsaks/grenssaks. Der skal selvfølgelig tages små bidder, og blødning skal selvfølgelig undgås.

Brug af klovbeskæringsboks

Hvis soen derimod har forvokset balle (den bløde del under soen, trædepuden), lange klove eller uens klove skal kloven beskæres i en egentlig klovbeskæringsboks. Denne proces foregår typiske i forbindelse med flytning af soen ind/ud af løbestalden. Ud over trimning af selve kloven skal vinklen på kloven – herunder beskæring af ballen – også foretages korrekt. Det er derfor vigtigt, at personalet har modtaget undervisning i klovbeskæring, inden det udføres.

Søer med sår ved kronrand, biklov eller kode skal



Søer med balleforhoring, lange klove og/eller uens klove mærkes op og beskæres i boks.

håndteres, så snart de observeres. Disse sår opstår ofte i farestien, fordi soen ligger ned i en stor del af døgnet, og fordi gulvet ofte er ujævnt.

Lange biklove kan trimmes, mens soen er i farestien.



Forebyggelse er naturligvis vigtig (kvalitet af gulv), men langt vigtigere er det at iværksætte en medicinsk behandling.

Selv mindre sår kan udvikle sig til en infektion i de underliggende væv, og disse er yderst vanskelige at helbrede. En grundig snak med besætningsdyrlægen er derfor nødvendig. Flere dyrlæge-

praksis tilbyder kursus i sårbehandling. Uanset hvad der iværksættes, skal såret være helet op inden fravænning. Alternativt bør soen slagtes.

Fakta

Følgende tiltag bør gøres for at passe på søernes klove:

- Hver gang soen flyttes, vurderes ben og klove.
- Lange biklove trimmes i farestien.
- Balleforhoring, lange klove og uens klove beskæres i klovbeskæringsboks.
- Søer med sår ved kronrand, biklov og/eller kode skal straks i medicinsk behandling (aftales med besætningsdyrlægen).
- Søer, der løbes til næste drægtighed, skal være i tip-top form.