

Energi- og vitaminindhold til smågrise


Sabine Stoltenberg Grove

Temagruppe Ernæring, d. 26. november 2025

Niveau af B-vitaminer

Energಿನiveau

Forsøgsdesign



Forsøgsdesign

- Indsættelse 14 dage efter fravænning → startvægt 8,5 kg
- I stalden 28 dage → afgangsvægt 27,5 kg
- Energiniveauer "lav vs. høj":
 - 14-28 dage efter fravænning 1,08 FEsv/kg vs. 1,13 FEsv/kg
 - 28-42 dage efter fravænning 1,06 FEsv/kg vs. 1,11 FEsv/kg
- Vitaminniveau baseret på norm:
 - 50 – 100 – 200% af normer for alle B-vitaminer

Foderblandinger


	Lavt energiindhold		Højt energiindhold	
	8-14 (132/11,0)*	14-26 (151/12,0)	8-14 (132/11,0)*	14-26 (151/12,0)**
FEsv pr. kg	1,09	1,06	1,14	1,11
Byg	36	34,6	20,0	20,0
Hvede	36	34,6	49,4	45,4
Sojaskrå	13	23	13,8	25,1
Kartoffelprotein	2,6	1,0	2,6	1,0
Fiskemel	1,6		1,7	
PFAD	1,4	1,7	2,7	3,1
Vallepulver	3,0		3,0	
Calciumformiat + benzo	1,5	0,5	1,5	0,5
B-vitaminer, % af normer	50	50 og 800**	50	50 og 800**

*Grise fra 8-14 kg får 20% slutfoder, da vitaminforblending er i slutfoder, det giver 136 ford. prot / 11,2 f. lysin pr FEsv


** Slutblanding i to versioner, med 50% norm B-vitaminer eller 800% af norm, B-vitaminer

Der er 80% fælles foder ved 3 vitaminniveau ved samme energiniveau


Foreløbige resultater




Foreløbige resultater



Foreløbige resultater




Foreløbige resultater



Foreløbige resultater

Foderudnyttelse - hangrise



Foreløbige resultater

Foderudnyttelse - sogrise

