


Nyt fra SEGES INNOVATION



Fordeling af polte efter rygspæktykkelse ved løbning over en periode. Det bedste er 13-14 millimeter (Grøn).

Få overblik over potentialet i dit sohold

Savner du et nemt og overskueligt værktøj til både at overvåge produktionen i dit sohold og vise, hvordan potentialet kan udnyttes bedre, så er Seges InSight løsningen.

Af Camilla Munk Asmussen og Gunner Sørensen, Husdyr, Innovation

Der sendes to rapporter, som handler om so- og pattegrise-overlevelse. De viser, hvornår og hvorfor man mister søer og pattegrise, og den enkelte besætnings resultater vises i forhold til kollegerne, så man kan sammenligne sine resultater med de bedste besætninger. Derudover vises det økonomiske potentiale i at forbedre overlevelsen af søer og pattegrise i besætningen. Rapporten med pattegrise-overlevelse sendes hver uge, mens rapporten med overlevelse af søer sendes en gang om måneden.

Overblik over produktiviteten

SoOptimizer er en rapport, som fokuserer på at vise de vigtigste faktorer for produktivitet og udbytte i et sohold og vise, hvordan niveauet er i forhold til de bedste kolleger. SoOptimizer sendes automa-

tisk en gang om måneden og fokuserer på de følgende fire centrale områder:

Stabil produktion

Ensartede holdstørrelser er den vigtigste faktor for at udnytte staldanlægget optimalt og samtidig give medarbejderne de bedst mulige forudsætninger for at udføre deres arbejdsopgaver. Antal dage fra fravæning til løbning og en faringsprocent på mindst 92 er nogle af de vigtige pejlemærker for at opnå en stabil produktion i et sohold. Hvis variationen i antal søer i holdene er for stor, giver det personalet i farestalden udfordringer med at håndtere det varierende antal, og samtidig påvirker det også antal og størrelse af de fravænnede grise, hvilket kan give bøvler i smågriseholdene.

Ensartet kvalitet af søer

Dette opnås, når der er overblik over poltenes alder og rygspæktykkelse ved første

SEGES
INNOVATION

løbning. Nye resultater fra Den rullende Afprøvning viser, at når flest mulige polte er 210-230 dage ved løbning og har en rygspæktykkelse på 13-14 millimeter, opnår man den længste produktionstid i soholdet og dermed den største indtjening per so. Det er vigtigt, at poltene oprettes i managementprogrammet med ID-numre fra polteleverandø-

Fakta

- Når du bruger Cloudfarms, Skiold eller AgroVision, kan du tilmelde dig Seges InSight via QR-kode eller på www.segesinsight.dk. Vi skal bruge oplysninger om produktionsform og kontaktpersoner, så rapporterne kan sendes direkte via mail.

ren/egen polteproduktion, så deres alder er kendt. Derudover bør poltenes rygspæktykkelse måles ved løbning, fordi det bidrager til løbende at kunne vurdere, om den valgte foderstrategi og management for poltene fungerer eller skal justeres. Figuren viser, hvor godt det er lykkedes at ramme den bedste rygspæktykkelse ved løbning (grønne polte). Man kan også følge udviklingen over de seneste 13, 26 og 52 uger. I dette eksempel har kun 20-25 procent af poltene den rigtige rygspæktykkelse ved løbning, så her vil der være en stor gevinst ved at ændre fodringen, så flere polte har en højere rygspæktykkelse ved løbning.

Udnyttelse af farestalden og soens pasningsevne

Farestalden er det dyreste afsnit i et produktionsanlæg, og derfor skal der være diegivende søer med mange grise i hovedparten af stierne. Rapporten viser udnyttelsen af farestierne og søernes pasningsevne.

Det anbefales, at rapporterne gennemgås sammen med dine samarbejdspartnere såsom dyrlæge, foder- og genetikleverandør, rådgivere med videre, så de også er en del af processen med at udpege, bidrage og følge op på af-talte indsatsområder.