



Slagtegrise tildelt vådfoder.

Slagtesvindet påvirkes af slagtetidspunkt, køn og fodringsmetode



Af Anna Krog Krstrup, Seges.

Slagtesvindfaktoren, som bruges til at beregne foderforbruget per kilo tilvækst, er i dag en konstant på 1,31, men bør tage højde for slagtetidspunkt, køn og fodringsmetode.

Grisenes genetik udvikles kontinuerligt og de vokser i dag hurtigere, har et lavere foderforbrug og en højere kødprocent.

Foderforbruget per kilo tilvækst beregnes ud fra slagtevægt omregnet til levende vægt. Dette sker i dag ved at bruge en konstant (1,31), selvom det er kendt, at slagtesvindfaktoren falder med stigende vægt og påvirkes af grisens køn samt fodring.

Der er netop afsluttet en afprøvning, som har undersøgt udviklingen mellem levende- og slagtevægt (forholdet = slagtesvindfaktor).

Der indgik so- og galtgrise, som var kønsvis opstal-

det og det blev undersøgt, om våd- og tørfoder har en betydning for slagtesvindet.

Resultaterne viser, at slagtetidspunktet har den største effekt på slagtesvindet. En slagtevægt på omkring 82 og 95 kg bør benytte en slagtesvindfaktor på henholdsvis 1,35 og 1,33 for omregning til grisens levendevægt og dermed beregning af foderforbruget per kilo tilvækst.

Galtgrise har et højere slagtesvind end sogrise, særligt ved tørfoder.

Sogrisene kan med fordel tildeles et par ekstra kilo inden slagtning, uden at det går nævneværdigt udover foderudnyttelsen.

Grisekongres 2025

- Hør meget mere om resultaterne og om, hvad man tjener på de sidste kilo gris samt hvordan du kan optimere din udleveringsstrategi på kongressen i Herning d. 21.-22. oktober.