

Flere producenter skal lære at håndtere en grisetype, som ikke passer ind i de traditionelle fodringsstrategier for sogrise eller kastrater. Foto: FBG Medier – Theis Meilby Eriksen.

Hyo

IV-hangrise kræver en ny fodringsstrategi

Immuno-vaccine-rede grise ændrer sig markant efter anden vaccination, og det skal afspejles i foderkurven.

Antallet af hangrise, der er immuno-logisk vaccinerede (IV), stiger eksplosivt i Danmark. Hvor der blev slagtet omkring 500.000 IV-hangrise i 2024, ventes tallet at nå cirka 2,1 millioner i 2026.

Det betyder, at flere producenter skal lære at håndtere en grisetype, som ikke passer ind i de traditionelle fodringsstrategier for sogrise eller kastrater.

Ifølge seniorkonsulent Anna Krog Krusturp, Seges Innovation, er den vigtigste erkendelse, at IV-hangrise ændrer sig markant efter anden vaccination.

– IV-hangrisen er en hybrid. Før anden vaccination opfører den sig som en hangris, men cirka en uge efter anden vaccination begynder den at æde som en galtgris, sagde hun på So- og fodringsseminar i Horsens.

Det betyder, at grisen har ét næringsstofbehov før anden vaccination og et andet bagefter. Derfor bliver spørgsmålet ikke længere, om der skal fasefodres, men hvordan.

Forsøg sammenlignede fire strategier

I et forsøg gennemført i 2024-2025 sammenlignede Seges Innovation fire fodringsstrategier: To enheds-

blandinger og to fasefodringsstrategier. Resultaterne viste, at den laveste enhedsblanding med 8,2 gram fordøjeligt lysin pr. FESv gav den laveste tilvækst.

På tværs af både sogrise og IV-hangrise steg tilvæksten fra 1.148 gram pr. dag til 1.172 gram pr. dag, når lysinniveauet blev hævet til 8,6 gram pr. FESv. Samtidig blev dækningsbidraget numerisk forbedret med 3-5 kroner pr. gris.

Anna Krog Krusturp understregede dog, at gennemsnittet skjuler store forskelle mellem kønnene.

Sogrise og IV-hangrise går hver sin vej

– Sogrisene og IV-grisene responderer vildt forskelligt på blandingerne, sagde hun.

Når resultaterne blev opdelt på køn, blev forskellene tydelige.

Sogrisene klarede sig bedst på en relativt enkel strategi med en enhedsblanding. Derimod kvitterede IV-hangrisene for en mere målrettet fasefodring, hvor de fik et højt lysinniveau frem til efter anden vaccination og derefter et lavere niveau.

I forsøget gav fasefodring det højeste dækningsbidrag hos IV-hangrisene. Her var der 18 kroners forskel

Af Jess Ulrik Verge



Udnyt at IV-grisen skifter fysiologi undervejs i produktionen. Det giver mulighed for både højere tilvækst og bedre økonomi, sagde Anna Krog Krusturp. Foto: FBG Medier – Jess Ulrik Verge.

mellem de IV-grise, som fik 8,2 gram fordøjeligt lysin som enhedsblanding og de IV-grise, som fik 8,2 gram fordøjeligt lysin fordelt som fasefodringsstrategi. IV-grisene på fasefodring startede på 9,2 gram fordøjeligt lysin og sluttede på 7,1 gram fordøjeligt lysin.

Mulighed for ekstra bundlinje
Budskabet fra Seges Innovation er derfor, at producenter med mu-

lighed for kønsopdelt fodring bør udnytte det.

Ved at tilpasse foderet til grisens vækstforløb kan man udnytte, at IV-hangrisen skifter fysiologi undervejs i produktionen. Det giver mulighed for både højere tilvækst og bedre økonomi.

– Få optimeret foderet i forhold til vækstforløbet og udnyt, at IV-hangrisen er en hybrid, lød konklusionen fra Anna Krog Krusturp ■

ER DIN KADAVERKØLER KLAR TIL FORÅRETS OG SOMMERENS VARME?

Kontakt os og få et godt tilbud på kølecontainer, kadaverkølerum eller nyt køleaggregat!



Se vort leveringsprogram og priser på

www.a-z-trading.dk

eller kontakt os



AZ-Trading ApS,

Lundsbjerg Industrivej 14,

6200 Aabenraa,

E-mail: aztradingaps@gmail.com,

Tlf. 74430055